

ENTOMOLOGISCHE
BEYTRÄGE

Z U

DES RITTER LINNE'

ZWÖLFTE AUSGABE

DES NATURSYSTEMS

V O N

JOH. AUG. EPHRAIM GOEZE,

Pastor an der Kirche S. Blasii zu Quedlinburg, Ehrenmitgliede
der Gesellschaft Naturforschender Freunde in Berlin, der
Herzoglichen deutschen Gesellschaft in Helmstädt, der
Naturforschergesellschaft in Halle, und der Königlich
Schwedischen patriotischen Gesellschaft
zu Stockholm.

DRITTEN THEILES VIERTER BAND.

L e i p z i g,

bey Weidmanns Erben und Reich. 1783.

ENTOMOLOGISCHE

BEYTRÄGE

DES HERRN LINNÉ

STÄNDIGES VERZEICHNIS

DES NATURSISTEMS

VON ALEXANDER GÖTTSCHE


Das Verzeichnis ist in zwey Theile getheilt. Der erste Theil enthält die Namen aller in Schweden vorkommenden Thiere, Pflanzen und Mineralien. Der zweite Theil enthält die Namen aller in Schweden vorkommenden Fische, Vögel, Insekten, Amphibien, Reptilien, Farnpflanzen, Moosen, Flechten, Pilzen, Mineralien, Metallen, Steinen, Erden, Oelen, Wässern, Luftarten, und Feuerarten.

IN STOCKHOLM BEY HERRN J. NEAUME

UND HERRN J. W. LUNDAHNS VERLAG

1790

Preis 1 Rthlr. 12 Schillinge



VORREDE.

Hier der vierte und letzte Band des dritten Theils meiner entomologischen Beyträge. Wann der fünfte Theil erscheinen werde, kann ich noch nicht mit Gewissheit bestimmen.

In der Vorrede zu den vorigen Theilen habe ich die entomologischen Schriften angeführt, die in der Zeit noch herauskamen, da die Theile abgedruckt wurden, die ich also bey meiner Handschrift selbst nicht anführen konnte. Jetzt sollte ich also aus Cramers und Espers Heften, wie auch aus Fabricii Spec. Inf. das Uebrige nachholen. Ich bitte aber meine Leser, diese Schriften selbst zu vergleichen, und das Fehlende ihren Exemplaren meiner Beyträge beyzufügen. Es würde die Vorrede sonst beynahe eben so stark, als dieser Band geworden seyn.

Lieber will ich einige, den Entomologen nützliche und sehr gegründete *Berichtigungen* mittheilen, die ich den freundschaftlichen Erinnerungen einiger meiner Freunde zu danken habe.

Zuerst von dem Herrn Pfarrer *Scriba* zu
Gräfenhausen.

Zum ersten Theil des dritten Bandes der Bey-
träge über die *Pap. Dan. Cand.*

- 1) Cramers P. D. C. *Nise* kann nicht Hecube, sondern ein anderer seyn. Der Sebaische ist es auch nicht.
- 2) Bey Eubule ist Seb. 38. f. 19. 20. angeführt, und eben dieser Sebaische steht unter den neuen *Lacte flavus*.
- 3) Bey Sennoe ist Seba t. 26. f. 5. 6. citirt; diese Larve und Puppe mit 7. 8. ist aber *Philea*.
- 4) Bey Cleopatra fällt also das Citatum Seba 26. f. 7. 8. weg.
- 5) Cramers *Eclipsis* ist nicht die Linnéische, sondern *Maerula Fabricii*.
- 6) Die Sulzersche *Teutonia* ist Cramers *Coronea*.
- 7) Die *Iphigenia* im Naturforscher ist Cramers *Pyrrha*.
- 8) Fabricii *Calypso* hat Seba t. 6. f. 9. 10. und t. 26. f. 3. 4.; letztere fällt also unter den neuen weg.
- 9) No. 84. unter den neuen Sebaischen ist *Leucippe* Cram. et Fabricii.
- 10) No. 89. unter den neuen ist *Odibes* Cram. der nämliche scheint auch Seba t. 18. f. 12. 13. zu stehen.
- 11) Der Bergsträsserische *Nelo* ist zuverlässig eine Varietät von *Rapae*.

12) *Creona*

- 12) Creona Cram. steht Seba t. 18. f. 4. 5.
- 13) Crameri Daplidice ist eigentlich Linn. Hellica.
- 14) Crabifera Cram. scheint Seba t. 38. f. 15. 16. zu seyn.
- 15) No. 97. Seba t. 45. f. 3. 4. oder t. 31. f. 9. 10. möchte Arganbe Fabric. seyn.

Vom Herrn Hofmeister *Knoch* zu
Braunschweig.

Diese sind wichtig und sehr genau.

Bey der Ph. Tortr. *Prasina* L. wird im Degeer Th. I. Qu. 1. S. 50. in der Note Rösels IV B. t. 22. angeführt, und im Naturf. VII. p. 139. dieselbe Röselsche Abb. für die Linn. *Prasina* ausgegeben.

Nach Degeer soll bey der *Prasin.* L. Raupe, Puppe und Schmetterling eine grüne Farbe haben. Dieses fällt aber bey dem Röselschen Schmetterling a. a. O. weg, indem die Puppe unten gelblich und oben röthlich blau aussieht. Daher bin ich der Meynung, daß Linn. *Prasin.* bey Rösel IV B. t. 10. f. 5. abgebildet worden, und eben diejenige sey, welche Füessli p. 41. n. 798. Ph. *Bicolorana* nennet, und also Degeer Tom. II. Qu. 2. p. 296. den Geoffr. Inf. II. p. 172. n. 124. Rösel IV. t. 10. und Réaum. I. t. 39. f. 10—14. mit Recht bey der *Prasina*

angezogen habe. Das Linnéische Citat bey der Prasinana aus Rösel IV. t. 22. ist meiner Meynung nach falsch. Man darf nur die Abbildungen des Réaumur, Degeer und Poda mit jenen, und unter einander vergleichen, um die Sache ins Reine zu bringen. Die Rösel'sche Phal. Tom. IV. t. 22. f. 5. *ist keine Tortrix*. Dieses weiß ich aus häufiger Erfahrung. Ich halte sie für Geoffr. Ph. verte ondée. II. p. 172. n. 125. Die Theresianer haben sich wahrscheinlich durch das falsche Zitat beym Linné verleiten lassen, die Prasin. mit der Ph. verte ondée für einerley zu halten.

Meine Leser vergleichen hierbey in diesem Bande p. 3. no. 285.



Beym Degeer Th. I. Qu. 2. S. 5. ist in der Note vieles von den Ursachen und Absichten der besondern Struktur des Gespinnstes der Ph. Pavonia gesagt worden. Seit vier Jahren habe ich Versuche mit diesen Gespinnsten gemacht. Ich habe die Reuse in der Mitte quer durch geschnitten, und die Puppe in dem untern weitem Theile, den ich mit einer Nadel

an

an dem Kasten feststeckte, liegen lassen. Ich habe davon *ganz ausgewachsene* Schmetterlinge bekommen; dabey aber die Vorsicht angewandt, daß ich sie in einem grossen Kasten, der inwendig nicht glatt war, auskommen liess. Denn die Männchen sind sehr lebhaft, wenn sie nicht durch die enge Oeffnung kriechen müssen, und fallen während des vielen Hin- und Herlaufens sehr leicht, zumal wenn der Deckel oder die Wände des Kastens glatt sind. Fallen sie aber ein oder mehrere mal; so werden es Krüppel, und ihre Flügel wachsen nicht gehörig aus. Diejenigen, welche durch die Reuse kriechen, und in ihrer Ordnung nicht gestöret werden, sitzen bald stille, und kommen nicht so leicht in Gefahr zu fallen. Die Weibchen müssen sich besonders sehr anstrengen, um durch die enge Oeffnung der Reuse zu kommen, und geben sich daher gleich zur Ruhe, um auszuwachsen.

Wozu also der künstliche Bau des Gespinnstes? Der Allmacht des Schöpfers war es gefällig, bey diesem Schmetterling einen andern und künstlichern Weg zu wählen, wodurch er aus seinem Behältniß kommen konnte.

Die vom Degeer T. II. p. 250. no. 2. beschriebene Phaläne kann nicht Atomaria L. seyn. Diese hat Frisch XIII. S. 12. t. 5. abgebildet, ist viel kleiner, und bey weitem nicht so groß, als die vom Degeer abgebildete. Degeer ziehet auch Schaeff. Icon. t. 17. f. 3. an, wo offenbar Prunaria L. abgebildet worden, die auch Kleemann in seinen Beytr. I. t. 23. f. 3. geliefert hat, und von dieser ist bey dem Degeer die Rede. Denn er sagt: die Flügel wären auf der Oberseite alle Orangegelb, welches bey dem Männchen vorzüglich eintrifft; bey der Atomaria Linn. aber, die auch im Naturforscher III. t. 1. f. 4. schlecht gezeichnet ist, nicht statt findet. In der Note sind Hufnagel Berlin. Magaz. IV. p. 570. n. 12. der faule Esel; Gleditsch Forstwiss. Th. I. p. 390. n. 7. *Kleemanns* Beytr. I. p. 285. t. 34. angezogen. Vergleicht man aber die Beschreibung der Raupe und des Schmetterlings, so Degeer T. I. Qu. 2. p. 103 — 106. von dem großen braunen Fleischfarbig gestreiften Stockspanner macht, mit Kleemanns Beschreibung am angef. Orte von der Raupe t. 35. f. 1. 2. 3. und hält damit des Hufnagels und Gleditsch Atomaria, und Linn. Hirtaria zusammen; so wird

wird man sich schwerlich enthalten können, unter allen diesen Namen die Hirtaria Linn. zu verstehen. Ich habe sie sehr oft aus der Raupe gezogen, und gefunden, daß die Degeerische Beschreibung l. c. und die Kleemannische mit der Natur genau übereinstimmen. Kleemann wußte es nicht, was für ein Schmetterling aus der t. 35. f. 1. 2. 3. abgebildeten Raupe komme. Denn er giebt die t. 34. f. 4. abgebildete für die Raupe des t. 34. f. 6. 7. vorgestellten Schmetterlings aus. Diese habe ich niemals gehabt, und wenn Kleemann darinn nicht irrt, wie ich denn nicht glaube; so hat der von ihm gezeichnete Spanner, oder Hirtaria Linn. *zweyerley Raupen*, wie ich dergleichen auch bey andern Arten gefunden habe. Des Degeer T. I. Qu. 1. p. 256. n. 6. t. 5. f. 21. beschriebene und abgebildete Phaläne halte ich für Atomaria Linn. Degeers Ph. Noctua Tom. II. Qu. 2. p. 293. und 294, so Schäffer t. 112. f. 1. 2. abgebildet, ist Linn. Ph. N. Exclamationis, und Hufnagels Ph. N. Clavus; also wohl keine neue Art. Es hat auch Degeer Tom. II. Qu. 1. p. 253. bey der Fasciaria Linn. den Rösel I B. Cl. 3. t. 3. unrecht citirt.

Uebrigens hat Herr Cammerrath *Jung* in seinem Verzeichniß der meisten bisher bekannten europäischen Schmetterlinge: 1782,

über die Atomaria,

— Aprilina,

— Ludifica,

viele Berichtigungen geliefert.

Bey dieser Gelegenheit aber kann ich nicht umhin, noch dieses anzuzeigen, wie mich Herr *Knoch* sehr versichert hat: daß Herr *Herbst* im 2ten Stück des Füessl. Archivs Männchen und Weibchen der Atomaria nebst der Raupe und Puppe, unter dem Namen: *Artemisaria*, Beyfußspanner, beschrieben und abgebildet habe.

Das 2te Stück der *Knochischen* Beyträge zur Insektengeschichte, mit sieben sehr fein ausgemalten Kupfertafeln, kann ich meinen Lesern abermal nicht genugsam empfehlen.

Herr *Knoch* ist so sehr philosophischer Beobachter und Entomologe, daß eben dadurch seine Beobachtungen an *Genauigkeit* und *Annehmlichkeit* einen vorzüglichen Werth erhalten, und eine große Menge schöner kostbarer Mahlbücher unserer Zeiten weit hinter sich zurücklassen, darinn man nichts, als Genera,
Spe-

Species, u. f. w. von der wahren Naturgeschichte aber fast gar nichts findet. Meine Leser werden mir danken, daß ich ihnen statt einiger magern Auszüge aus jenen, aus diesen einige lehrreiche und höchst interessante Bemerkungen mittheile.

In der Vorrede sagt Herr K. sehr richtig: daß man doch allen Fleiß anwenden möchte, die Abbildungen natürlicher Dinge der Natur so getreu als möglich zu machen, weil sonst die Herrlichkeit des Schöpfers mit entstellt würde. Ein Vorzug, den nur solche geschickte Hände, als die Knochischen, die selbst so vortrefflich zeichnen, ihren Werken geben können!

Ferner eine ansehnliche Vermehrung einer Fauna Bructera. Er hat, wie ich, angemerkt, daß in dem Moosse des Berges viele Puppen unbekannter Spannmesser liegen.

P. 1. Ph. N. virens L. n. 139. davon p. 2. eine eigene Besonderheit. Die Zunge dieser Phal. ist von der Basis an bis in die Mitte gespalten, da sie sonst nur von der Mitte bis an die Spitze gespalten ist. Vielleicht ist sie hier nur zusammengeklebt gewesen, wie mir oft vorgekommen
men

men ist. Diese Phaläne ist auch hier zum *erstenmal* abgebildet.

P. 4. Ph. Geom. pustulataria, die L. nicht hat.

P. 7. Ph. G. Prunaria L. Varietas, zu der verschiedene Citata bey der Sordjata L. gehören. Die Beschreibung der *Raupe* in schönem Latein, meisterhaft. Kenner der Entomologie werden die Schwierigkeit einer solchen Beschreibung fühlen, besonders bey Larven, die so sehr variiren, und sich durch keine merkliche Farben auszeichnen.

Besonders genau p. 12. die Bemerkungen über die Oekonomie und Lebensart dieser Raupen.

P. 17. heist es unter andern in der Anmerkung: „Könnte man die mannigfaltigen Abänderungen, die sich sowohl an Kammförmigen als Borstenähnlichen Fühlhörnern der Schmetterlinge finden, ohne Hülfe eines Vergrößerungsglases bemerken; so glaube ich, nicht ohne Grund, daß selbige bey sehr vielen Gattungen ein wesentliches Unterscheidungszeichen abgeben würden.“

Es wären denn doch dies nur einzelne Merkmale, die nie einen vollständigen Begriff eines
natür-

natürlichen Körpers geben. Sie müssen alle zusammen genommen werden.

P. 21. no. 4. Ph. N. Lucipara L. no. 181. t. 1. f. 4. 6. 7. Hier zum *erstenmale* abgebildet. p. 28. sehr artige philosophische Anmerkungen.

„Linné, sagt der V. giebt diese Art für selten aus. Ihm selbst ist er im Freyen nie zu Gesicht gekommen; da hingegen die Raupe jährlich in großer Menge vorhanden sey. Wie viele der bereits bekannten Nachtschmetterlinge würden also fehlen, wenn ihre Raupen nicht aufgesucht wären, die sich wegen ihrer lebhaften Farben, ihrer Begierde zur Nahrung, und der davon zurückgebliebenen Spuren, oft ihrer, das Auge an sich ziehenden Kunsttriebe, ihrer Unruhe bey bevorstehender Verwandlung, und anderer Ursachen wegen nicht so sorgfältig verbergen können, als sie es größtentheils in ihrem letzten und vollkommenen Zustande zu thun pflegen, worinn sie am Tage gewöhnlich der Ruhe genießen, und einen ihren trüben und dunklen Farben sehr ähnlichen Aufenthalt wählen, der sie auch oft durch seine Dunkelheit gegen alle Nachstellungen in Sicherheit setzt? Dahingegen finden sich meistens an denen Schmetterlingen sehr in die Augen fallende Far-

Farben und Zeichnungen, deren Raupen uns durch ihr Ansehen und durch den Aufenthalt in Saamenkapseln, in dem Mark des Holzes, oder in der Erde sehr oft verborgen bleiben.“

Bey gewissen *Käferarten* ist das Verhältniß fast eben so. Wie lange sind die unansehnlichen Larven der Prachtkäfer (*Buprestis*) in alten faulen Holzstämmen verborgen geblieben, und wie schön sind oft die Käfer?

P. 29. Ph. N. *Tanaceti* no. 5. t. 2. f. 1. 9.

Abermal hier *zuerst* abgebildet. Die Raupen können seitwärts, wie einige Blattwickler, 5 bis 6 Zoll weit springen.

P. 36. eine artige Bemerkung, die ich auch aus meiner Erfahrung sehr wahr befunden habe:

„Obgleich diese Raupe eine glatte Haut und helle in die Augen fallende Farbe hat; also von dieser Seite gegen ihre Feinde nicht sonderlich geschützt ist; so habe ich dennoch keine, auch selbst nicht unter den gesündesten Ausgewachsenen gefunden, deren ich oft eine Menge zusammengebracht, welche von andern Insekten beschädigt gewesen wären. Auch waren die Puppen, welche mir nicht ausgekommen sind, niemals besetzt. Ich will es

es gern zugeben, daß sie sich durch ihr starkes Schlagen mit dem Kopfe, und andere heftige Bewegungen gegen die Angriffe ihrer Feinde vertheidiget. Allein warum setzen diese Waffen nicht auch andere Arten, welche damit versehen sind, in Sicherheit? Sollten vielleicht die bittren Säfte, welche unsere Raupe aus ihren Nahrungspflanzen zieht, den gewöhnlichen Raupenverfolgern einen Ekel erregen, so wie den Bohrkäfern, Holzläusen und Schabkäfern bey aufgetrockneten Insekten, welche mit bittern Extrakten bestrichen sind? Ich wünschte, daß auch andere Naturforscher hierüber Beobachtungen anstellen möchten.“

Diese Raupen brachten ihre Puppenhülle ohne Erde aus grossen und kleinen Stücken von morschem Weidenholze, die unter ihre Futterkräuter geworfen waren, glücklich zu Stande.

P. 38. 39. 40. 41. ist das kunstmässige Verhalten der Raupe in Verfertigung ihres Gespinnstes beschrieben, da sie in Verlegenheit gesetzt war, ihren Bau nach einem ganz andern Plan, als der ihr in der Natur angewiesen war, also nur nach den zufällig veranlaßten Umständen, zu machen, wobey der V. sagt: „Ich glaube nicht zu irren, wenn ich diese Kunsthandlung

lung unter *die ersten* setze, die jemals an Insekten bemerkt worden sind.“

Und wir stimmen ihm völlig bey. Der gleichen Bemerkungen können nicht genug gesammelt werden. Die Handlung der Raupe zeugt offenbar von gewissen Graden von Verstandeskräften. Und solche Anmerkungen sind die rechten Materialien zu einer *Psychologie der Thiere*.

P. 44. sagt der V. in der Anm. „Die *verlängerten Zungenfutterale* sind beynahe ein unterscheidendes Merkmal bey allen Puppen der *Kappenhalsigen Eulen*; doch weichen sie auch unter sich von einander ab.“

Sehr richtig und wahr. Ich fordere hierdurch den Verfasser öffentlich auf: *die Kappenhalsigen Eulen* von den *Noctuis* L. ganz zu trennen, und sie zunächst auf die *Sphinges* folgen zu lassen. Sie verdienen es, und geben dazu selbst die Charaktere an die Hand. Er ist auch der Mann dazu, der nicht nöthig hat, in verba Magistri jurare. —

P. 47. no. 6. Ph. N. *Artemisiae*, die L. nicht hat.

P. 50. von den *Dörnchen an den Fußblättern* dieser *Kappenhalsigen Eulen*, daß sie wegen

gen ihrer *Ordnung* sehr in die Augen fallen, fast allen Eulen gemein sind, und wahrscheinlich zum Mittel dienen, sich fest anzuhalten.

P. 51. no. 7. Ph. N. Trapezina L. no. 99.
Von den Mordraupen dieser Phaläne p. 55. besondere Bemerkungen:

1) Dafs sie *in ihrer Freyheit* auch andre Raupen verzehren, wobey sie der V. oft angetroffen hat.

2) Dafs sie sich ungern wieder an Pflanzen gewöhnen, wenn man sie eine Zeitlang mit andern Raupen gefüttert hat.

3) Dafs sie durch das Fleischfressen bisweilen etwas von der grünlichen Farbe verlieren, und bräunlich werden.

4) Dafs eine Kleinere oder Schwächere oft einer Größern überlegen wird, und dieselbe auf die hinterlistigste Art angreift.

„Sie sucht ihr erst von hinten zu durch einen tückischen Biß eine Wunde beyzubringen. Ist ihr solches geglückt; so läßt sie die Verwundete so lange unangefochten, bis sie von ihrer Wunde matt und krank wird. Dann fällt sie über sie her, und giebt ihr die letzten tödtlichen Bisse.

Nach p. 56. ist dem V. Sphinx Euphorbiae nach acht Tagen ausgekommen, der gewöhnlich ein, auch zwey Jahr in der Puppe liegt. Also giebt's wegen der gewissen Zeit des Auskommens noch keine Regel.

P. 58. no. 8. Ph. B. Fagi L. no. 30. Von der Larve p. 59. abermal eine meisterhafte Beschreibung. Ihre Geschichte ist noch nicht aufgeklärt genug. Von ihren unförmlich langen Füßen, welche Absicht? Offenbar erschweren sie ihr das Gehen. Sie stämmt sie in die Höhe, wenn ein Geräusch gemacht wird, oder wenn sie Gefahr fürchtet. Die Schmetterlinge kommen äußerst selten vollkommen aus den Puppen, wenn sie auch gar nicht in ihrer Ruhe gestört werden. Was mag davon die Ursache seyn?

P. 68. no. 9. Ph. G. pulveraria L. no. 215. Diese, die wahre *Clerksche*, aber nicht *Defoliaria*.

P. 71. no. 10. Ph. N. Parthenias L. no. 94. t. 3. f. 8. zum *erstenmale* hier abgebildet: das *Weibchen*. Es ist dieselbe, als unter meinen neuen Ph. glaucescens: Beytr. III Th. 3 B. p. 206. no. 63.

P. 75. no. 11. t. 4. Ph. Pyr. Tarficrinalis, der *Haarfuss*. Eine ganz *neue Art*.

P. 79. no. 12. t. 5. f. 1-6. Ph. Pyr. Barbalis L. no. 29. wegen der Haare und Fühlhörner merkwürdig.

P. 81. no. 13. t. 5. f. 8. Ph. Tin. Degeerella L. no. 426. Aeufserst lange besondere Antennen.

P. 85. no. 14. Pap. Pl. Rur. W album, das weisse W. t. 6. f. 1. 2. Varietas Pap. Illicis Esper. An diversa species?

P. 88. no. 2. t. 6. f. 3. Pap. Pl. Rur. Hippothoë. Varietas foeminae.

P. 90. no. t. 6. f. 4. 5. Pap. Pl. Rur. Amphidamas.

P. 93. no. 4. t. 6. f. 6. 7. Pap. Pl. Rur. Erebus. Eine ganz neue Art.

Die t. 6. abgebildeten Tagfalter sind alle merkwürdig. Ihre Geschichte, so wie andrer ihres Geschlechts, verdient noch immer eine genaue Untersuchung. Auch ist es merkwürdig, daß einige dieser Pap. Pl. Rural. in verschiedenen Gegenden häufig, in andern gar nicht gefunden werden. In unserer Gegend Hippothoë,


pothoë, Amphidamus, W album und Erc-
bus gar nicht; Virgaureae äusserst selten.

P. 95. Scarab. hemipterus L. no. 63. t. 7.
f. 11. 12. wegen des besondern Kopfs. f. 12.

Gewiss ist in diesen wenigen Bogen mehr
wahre Naturgeschichte enthalten, als in man-
chem prächtigen ausgemahlten Werke, das
einige hundert Thaler kostet.

Vor der Neujahrsmesse 1783.

G O E Z E.



V. *Blattwickler*. Ph. Tortrices. *)


Chenilles plieuses Papillons (Phalenes) larges d'épaules. Réaum.

Nach der Wiener Entomologen Eintheilung: *Syst. Verz. der Schmetterlinge der Wiener Gegend* p. 125. giebt es sechs Klassen derselben.

- 1) Grüne; 2) Metallische; 3) Gelbe; 4) Braune;
- 5) Graue; 6) Düstere.

282. Phal.

*) Linné hat sie alle unter dem allgemeinen Namen: Tortrices, begriffen; allein Reaumur hat schon einen Wink gegeben, daß ihre Oekonomie und Verwandlung nicht nach einerley Ordnungen und Gesetzen erfolge, mithin darinn schon der Grund zu einer natürlichen, und der Erfahrung gemäßen Eintheilung zu suchen sey. S. *Mém. des Inf.* Tom. II. *Mém.* 5. 6. &c. Er setzt unter diesen *Raupenarten* drey Ordnungen: 1) einige biegen nur den Rand des Blatts über oder unter sich, und überziehen den noch offenen Raum mit einem Gewebe (*Chenilles plieuses*); 2) andere rollen das Blatt in mehrere Windungen (*Chenilles rouleuses*). Jene also *Blattwickler*; diese *Blattroller*. 3) Noch andere spinnen mehr Blätter zugleich oder die Blüthen der Pflanze in einen Knospen zusammen, und dieses entweder einsam, oder gesellschaftlich (*Chenilles lieuses en paquet*; *Chenilles lieuses des fleurs*); *Blattbinder*. S. Abhandl. von der *Wickelraupe*, nebst einigen Vorschlägen zu derselben Vertilgung. 8. Berl. und Leipz. 1779. mit e. Kupfer. Es ist dies aber Ph. G. L. *Brumata*, und keine *Tortrix*.



282. Phal. *Tortr. Creana*, die *Wachsmotte*. *)

Müllers Linn. Naturfyst. 5 Th. 1 B. p. 722. no. 282.
der *Honigdieb*.

Fabric. S. E. p. 655. *Tinea*. 1. *Cerella*:

Alis griseis, postice emarginatis: dorso canaliculato, fusco.

283. *Fasciana*, das *Weißband*. **)

Müller l. c. p. 723. no. 283. *Weißband*.

Wiener Schmett. p. 131. E. Graue Blattwickler, Ph.

Tortr. Cinereae: n. 36. *Unbekannte Raupe*;
Dunkler Wickler mit breitem weißem Querbande. *T. Fasciana* L.

Geoffr. Inf. II. p. 188. no. 14. *Tinea fusca*, capite fusco, alis pone albidis.

La *Teigne bedaupe à tête brune*. Long. 4
lign.

Raj. Inf. p. 204. no. 99. *Phalaena parva*, alis oblongis, *Tineae* instar, e fusco et albo bicoloribus, nigra parte alba longiore.

Aequa-

*) Ich kann nicht sagen, was den *Linué* bewogen hat, diese unter die *Wickler* zu setzen, da sie eher zu den eigentlichen *Motten*, *Tinea*, zu gehören scheint. Ich habe die Verwüstungen der *Larve* an einer mit Wachs und Harz imprägnirten *Kindesmumie* erfahren. Als ich sie vor drey Jahren bekam, waren hin und wieder kleine mit Wurmmehl angefüllte Löcher zu sehen. Dies bewog mich, sie eine geraume Zeit in Weingeist zu legen, und wieder zu trocknen. Dessen ohnerachtet zeigen sich bis jetzt noch immer kleine weiße Larven darinn, die sie durchlöchern. Das Wachs muß vorzüglich die Nahrung der Larven seyn. Ich kann aber nicht sagen, ob es dieselbe Art mit denen in den Bienenstöcken sey, weil ich sie nicht zur Verwandlung bringen können.

**) Nicht abgebildet.

Aequalis vestivorae, at paulo minor.

Scop. Ent. carn. p. 233. no. 586. Phal. Fasciana.

Alae anticae supra fusco glaucoque variae;
fascia lata postica albida.

Habitat in *Pomis*, quorum folia convolvit.

Long. Lin. 4. Lat. 2 $\frac{1}{3}$.

Mülleri (Otto Fridr.) *Faun. Fridr. p. 55. no. 471.*

Ph. T. fasciana. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1494. Nom. Linn.*

284. *Uncana*, der Klauenflügel.

Müller l. c. p. 723. no. 284. Klauenflügel.

*Wiener Schmett. p. 91. Y. Afterspannraupen, Lar-
vae Pseudogeometrae; Blendende Eulen, Ph.
Noct. Submetallicae: n. 4. Unbekannte Raupe;
Braunblanke weißgezeichnete Eule; N. Unca.
Ph. Geom. Uncana L.*

*Fabric. S. E. p. 646. no. 7. Pyralis uncana. Nom.
Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 277. no. 8.*

*Otto Fabric. Faun. Groenl. p. 195. no. 151. Nom.
Linn.*

Habitat inter frutices ad ripas rivulorum.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 455.

— *Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1495. Nom. Linn.*

Clerk Phal. t. 3. f. 7.

285. *Prasinana*, der Graßgrünwickler. *)

Müller l. c. p. 723. no. 285. der Erlenwickler.

A 2

Füeslins

*) Die beyden vom *Linné* angeführten Schriftsteller bey dieser *Prasinana*: *Réaumur*, und *Degeer* gehören nicht zu derselben, sondern zu einer besondern Art, welche *Füesl.* *Bicolorana* nennet. Wegen des rothen Flügelrandes aber möchte die *Geoffroy'sche* II. no. 125. wohl die wahre *Prasinana* L. seyn.

Frieslins Verz. Schweiz. Inf. p. 41. no. 797. Ph. *Prasina*. Bey uns selten auf *Eichen*.

Röfels Insektenbel. IV. p. 252. t. 22. die zu der NV. 2ten Kl. gehörige schöne gelblichtgrüne Büchenraupe. *)

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 94. no. 271. der *Erlenwickler*.

Wiener Schmett. p. 125. A. *Grüne* Blattwickler, Ph. Tortr. *Virides*: no. 2. *Hageeichenwickler*rraupe (Querc. Rob.); *Hageeichenwickler*. T. *Prasin.* L.

Gleditsch Forstw. I. p. 557. no. 13. Ph. Tortr. *prasinana*, das *grüne Blatt*, der *grüne Blattwickler*. p. 656. no. 44. der *gelbgrüne weißpunktirte Blattwickler*.

Bkm. Ep. S. Linn. p. 167. no. 285. Ph. T. *prasinana*. Nom. Linn.

Geoffr. Inf. II. p. 172. no. 125. *Phalaena* *Seticornis* *Spirilinguis*; alis deflexis viridibus; fascia duplici transversa saturatiore. **)

La *Phalène verte ondée*.

Long. 7 Lign.

Fabric. S. E. p. 645. no. 3. *Pyralis prasina*. ***)

Variat antennis pedibusque albis et fulvis.

— Ejusd. *Species Insectorum* I. p. 276. no. 5. *Pyralis Fagana*.

Alis

*) Die *Röfelsche* IV. t. 22. ist mit der t. 10. nicht einerley, sondern die letztere ist die *Bicolorana* des *Friesl.* Réaum. und Degeer.

**) Ses Ailes superieures sont vertes, bordées d'un peu de rouge et nuancées de trois bandes presque transverses d'un vert plus foncé.

***) *Röfel* IV. t. 10. wie auch Réaum. und Degeer gehören nicht hieher.

Alis viridibus, strigis tribus obliquis albis;
antennis pedibusque fulvis.

Larva viridis, linea laterali flava, cauda bifida.

Pupa intra folliculum, gibbosum, ferrugineum.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 456. Ph. T. *prasinana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1496. Ph. T. *prasinana*. Nom. Linn.

286. *Viridana*, der *Grünwickler*. *)

Müller l. c. p. 723. no. 286. der *Grünwickler*.

Früßl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 799. Ph. *Viridana*.
Sehr häufig auf *Eichen*.

— Magaz. der Entomol. II. p. 38. Ph. *Viridana*.
Die Raupen des Chorherrn *Meyer* hatten alle auf dem achten Absatz braune Flecke.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4 Kl. p. 5. t. 1. der in den *Eichenblättern* wohnende *grüne Blattwickler* mit kleinen schwarzen Punkten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 29. der *Grünwickler*.

Wiener Schmett. p. 125. A. *Grüne Blattwickler*: no. 3. *Kahneichenwickelraupe* (*Querc. Rob.*); *Kahneichenwickler*. T. *Viridana* L.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 656. no. 45. der ganz *grüne Blattwickler sonder Flecke*, II. p. 752. no. 78.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 463. E. *Blattwickler*: no. 22. der ganz *grüne Eichenwickler*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 371. no. 17. *Viridana*.

A 3

Oekono-

*) Das Zitatum: *Frisch* III. n. 8. t. 5. das *Linne* hierbey angeführt hat, gehöret zu *Clorana*.

Oekonomische Nachrichten der patriotischen Gesellschaft. in Schlesien I. p. 142. 143. 152.

Der fahlgrüne Blattwickler für die Obstbäume der gefährlichste; der minder gefährliche, doch immer schädliche, der schwarze bunte und gestreifte.

Behm. Epit. S. L. p. 167. no. 286. *T. Viridana.* Nom. *Linn.*

Syst. Natur. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 85. *Phalène du Saule.*

Geoffr. Inf. II. p. 171. no. 123.

Phalaena feticornis spirilinguis, humeris latis, antennis flavescentibus, alis dilute virescentibus.

La Chappe verte. Long. 4 lign.

Fabric. S. E. p. 646. no. 4. *Pyralis Viridana.* Nom. *Linn.*

Larva nuda, 16poda, viridis, nigro-punctata; pedibus posticis flavis.

Pupa brunnea, postice stylo bifido.

— *EjUSD. Species Inf.* II. p. 277. no. 6. *P. viridana.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 457. *T. Viridana.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1497. *T. Viridana.* Nom. *Linn.*

287. *Clorana*, der *Wollweidenwickler.*

Müller l. c. p. 724. no. 287. t. 22. f. 13. der *Weidenwickler.*

Füeslins Schweiz. Inf. p. 41. no. 800. Ph. *Clorana.*

— *Magaz. der Entomol.* p. 38. Ph. *Clorana.* Nach des Chorherrn *Meyer* Bemerkung überwintern die *Puppen.* *Rösel* sagt: nach 14 Tagen erschienen

schienen die Vögel. Vermuthlich zwei Genera-
tionen im Jahr.

Frisch Inf. III. p. 18. no. 8. 2 Pl. t. 5. die kleine
graue *Weidenraupe* mit dem grünen *Zweifal-*
ter — mit ganz grünen *Oberflügeln* mit weißem
Saum, und weißen *Unterflügeln* (also der *Rö-*
selsche I. NV. 4 Kl. t. 3.).

Röfels Insektenbel. I. NV. 4 Kl. p. 8. t. 3. der dicke
grünlichgraue *Blattwickler* zwischen den *Weiden-*
blättern.

Maders (Kleem.) *Raupenkal.* p. 60. no. 167. der
Weidenwickler.

Wiener Schmett. p. 126. A. *Grüne* *Blattwickler*: no.
4. *Weidenwickelraupe* (*Salic. Pentandr.*); *Wei-*
denwickler. T. *Clorana* L.

Réaum. Inf. II. *Mém.* 5. p. 236. t. 18. f. 6. 7. f. 4.
Coque en bateau.

Fabric. S. E. p. 646. no. 5. *Pyralis Clorana*.
Nom. *Linn. Spec. Inf.* II. p. 277. no. 7.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 458. T. *Clorana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1498. T. *Clorana*.
Nom. *Linn.*

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 475. no. 8. t. 10. f. 5-
9.

Phaléne chappe verte à bordure blanche.

Phaléne à antennes filiformes à trompe, à ai-
les larges en toit vertes en dessus bordées de blanc,
& blanches en dessous.

— *Uebersf.* 2 B. 1 Th. p. 350. no. 8. t. 10. f. 5 - 9.
die grüne weißgerändelte *Mantelphaläne*.

288. *Litterana*, der *Buchstabenflügel*. *)

Müller l. c. p. 724. no. 288. der *Buchstabenflügel*.

A 4

Friesst.

*) Nicht abgebildet.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 801. Ph. Litterana.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 753. no. 77. T. litterana, der dunkelgrüne Blattwickler mit schwarzen Zeichnungen.

Der Wiener Nachtrag p. 317. Tortrices. A. Grüne Wickler: no. 5. Unbekannte Raupe; hochgrüner schwarz gezeichneter Wickler. T. Litterana L.

Fabric. S. E. p. 646. no. 6. Pyralis Litterana.

— *Spec. Inf. II. p. 284. no. 51.*

289. *Zoegana*, der Rostpunkt.

Müller l. c. p. 724. no. 289. der Wechselfunkt.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 802. Ph. Zoegana. Bey uns selten.

Wiener Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no. 4. Unbekannte Raupe; strohgelber Wickler mit einem braunen Winkelstrich.

Fabric. S. E. p. 648. no. 18. Pyralis Zoegana.

Alis flavis; puncto medio lituraque postica ferrugineis.

— *Spec. Inf. II. p. 280. no. 25.*

Clerk Phal. t. 4. f. 4.

290. *Hamana*, der Hakenflügel.

Müller l. c. p. 724. no. 290. der Hakenflügel.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 754. no. 79. T. hamana.

Der Blattwickler mit gelben Oberflügeln, die mit einem braunrothen Punkte und einer solchen hakenförmigen Zeichnung versehen sind.

Wiener Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no.

3. Unbekannte Raupe; zitrongelber Wickler mit einem braunen Wiederhaken. T. Hamana. L.

Fabric. S. E. p. 648. n. 18. β. Pyr. Hamana. Nom. Linn.

(als eine Abänderung der Zoegana.)

Clerk

Clerk Phal. t. 4. f. 47.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1500. T. *Hama-*
na. Nom. *Linn.*

291. *Kaekeritziana*, der *Upsalische Einpunkt*. *)

Müller l. c. p. 725. no. 291. der *Einpunkt*.

Wiener Schmett. p. 177. C. Gelbe Blattwickler: no:
1. *Unbekannte Raupe*; *bleichgelber Wickler mit*
einem Mittelpunkt. T. *Kaekeritziana* L.

292. *Oporana*, der *Netzförmige Wickler*.

Müller l. c. p. 725. no. 292. das *Netz*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 788. no. 15. T. *Oporana*,
die *rothgraue gefleckte und gegitterte Aepfel-*
baummotte.

Wiener Schmetterl. p. 128. D. *Braune Blattwickler*,
T. *Ferrugineae*: no. 2. *Zwetschenwickelraupe*
(*Pruni domest.*); *Zwetschenwickler*. T. *Opora-*
na L.

Glasers physik. ökon. Abh. von den schädlichen
Raupen der Obstbäume. (neue Ausg. 1780.) p. 35.
t. 3. f. 5. 6. 7. **)

Fabric. S. E. p. 651. no. 33. *Pyrallis Oporana*.
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 283. no. 43.

Geoffr. *Inf.* II. p. 170. no. 119.

A 5

Pha-

*) *Nicht abgebildet.*

**) Da diese Wickler so sehr in der Farbe ändern, und gelblich,
bräunlich, grünlich und röthlich gefunden werden; so trage ich
kein Bedenken, die *Glaserschen* Wickler hierher zu ziehen. Ob-
gleich der *Röfelsche* I. NV. 4 Kl. t. 2. vom *Geoffroy* hierher
gerechnet wird; so wollte ich ihn doch lieber mit andern Schrift-
stellern für die folgende *Rosana* L. halten.

Phalaena feticornis spirilinguis, humeris latis, aurato-flavescens, alarum fascia transversa, maculaque duplici fusca.

La Chappe à bande ♂ tache brune. Long. 4 lign.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1499. T. Oporana. Nom. Linn.

293. *Rosana*, der *Rosenwickler*.

Müller l. c. p. 725. no. 293. der Rosenwickler.

*Röfels Infektenbel. I. NV. 4 Kl. t. 2. p. 7. der schwarze Blattwickler mit weißen Punkten auf den Kirschbäumen. *)*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 18. no. 30. der Rosenwickler.

Füßl. Magaz. der Entomol. II. p. 38. T. Rosana (mit dem Röfelschen Zitato I. NV. 4. t. 2.). Die Raupe auch in Haselblättern und Eichenblättern. Sind den Schlupfwespen unterworfen.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 869. no. 1. T. Rosana, die kleine Blattwicklermotte des Rosenstrauchs.

— p. 1033. no. 4. *T. Rosana*, die *Rosenblattwicklermotte* mit der grauen Querbinde in den Oberflügeln.

Blankaart Schaupl. der Raupen t. 8. f. E F G H.

Wiener Schmett. p. 128. C. Gelbe Blattwickler: no. 10. Heckenrosenwickelraupe (Rosae caninae); Heckenrosenwickler.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 86. Phalène de la Rose.

Adf.

*) Aus diesem Röfelschen macht der Staatsr. *Müller Faun. Fr. p. 58. n. 523.* eine neue Art von Motten: *Ph. Tinea Hebenstreitella*:

Alis subfuscis, priorum maculis tribus obscuris umbraticis.

Act. Upsal. 1736. p. 25. no. 77. Papilio alis depressis brevissimis testaceis.

Fabric. S. E. p. 647. no. 9. *Pyralis Rosana.* Nom. Linn.

— *Spec. Insect.* II. p. 278. no. II.

Réaum. Inf. II. t. 15. f. 5-9.

Degeer Inf. I. Mém. 13. p. 403. t. 27. f. 4. 8. II. 12.

14. *Uebersf.* I. 3 Qu. S. 17.

— *Tom.* II. P. I. p. 468. no. I.

Phalène à antennes filiformes à trompe; à ailes larges brunes; à taches & lignes transverses obscures, dont les inférieures sont noirâtres en dessus, à barbillons courbés.

Phalène chappe brune à réseau des arbres fruitiers.

— *Uebersf.* II B. I Th. p. 345. no. I. der netzförmige Braunmantel auf den Obstbäumen.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 130. no. 1503. T. *Rosana.* Nom. Linn.

294. *Gnomana*, die Querstreife.

Müller l. c. p. 725. no. 294. der Schiefband.

Wiener Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no.

7. Unbekannte Raupe; blaßgoldgelber Wickler mit rothbraunen Schrägstreifen.

Fabric. S. E. p. 651. no. 32. *Pyralis Gnomana.* Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 285. no. 42.

Clerk Phal. t. 4. f. 13.

Geoffr. Inf. II. p. 171. no. 121.

Phalaena feticornis spirilinguis, humeris latis, flava, fascia transversa fusca.

La Chappe brune à bande brune.

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 469. no. 3.

Phalène à antennes filiformes à trompe, à ailes larges d'un jaune foncé à lignes obliques & nuances brunes.

Phalène chappe jaune à bande brune du Poirier.

— *Uebersf.* II B. I Th. p. 346. no. 3. der *Gelbmantel* mit einer braunen Binde auf den *Birnbäumen*.

295. *Xylosteana*, der *Heckkirschenwickler*.

Müller l. c. p. 725. no. 295. der *Kreuzträger*.

Neuer Schaupl. der Natur II B. p. 247. der *Kreuzträger*.

Wiener Schmett. p. 128. D. Braune Blattwickler, T. Ferrugineae: no. 4. *Heckenkirschenwickelraupe* (Lonicerae Xylostei); *Heckkirschenwickler*. T. *Xylosteana* L.

Clerk Phal. t. 2. f. 6.

Fabric. S. E. p. 648. no. 14. *Pyrallis Xylosteana*.

Alis anticis testaceis; fascia fusca.

— *Spec. Insect.* II. p. 279. no. 19.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1501. T. *Xylosteana*. Nom. *Linn.*

296. *Arcuana*, der *Bogenwickler*.

Müller l. c. p. 726. no. 296. die *Bogenbinde*.

Wiener Schmett. p. 126. B. Metallische Blattwickler: no. II. Unbekannte Raupe; goldgelber *Wickler* mit einer schwarzen Makel und Silber. T. *Arcuana* L.

Catholicon A. p. 456. T. *Arcuana*.

Fabric. S. E. p. 649. no. 22. *Pyrallis Arcuana*.

Alis luteis; fasciis tribus *arcuatis* maculaque disci atra; punctis tribus argenteis — Lineolae tres argenteae ad basin alarum.

— Spec. Inf. II. p. 281. no. 31.

Clerk Phal. t. 10. f. 8.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 461. T. *Arcuana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1506. T. *Arcuana*.
Nom. *Linn*.

297. *Avellana*, der *Haselwickler*.

Müller l. c. p. 726. no. 297. *Haselwickler*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 570. no. 9. T. *Avellana*,
der *braune bandige Blattwickler der Haselstau-*
de.

Wiener Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattwickler, T.
Flavae: no. 8. *Haselstaudenwickelraupe* (*Coryli*
Avellanae), *Haselstaudenwickler*. T. *Avellana* L.
Catholic. A. p. 631. T. *Avellana*.

Albin Inf. I. t. 95. f. g. h.

Fabric. S. E. p. 650. no. 25. *Pyralis Avellana*.
Nom. *Linn*.

— Spec. Inf. II. p. 281. no. 34.

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 460. T. *Avellana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1505. T. *Avellana*.
Nom. *Linn*.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 72. Phal.
des Jardins.

298. *Ameriana*, der *Gemeinstrich*.

Müller l. c. p. 726. no. 298. der *Gemeinstrich*.

Füesl. schweiz. Inf. p. 41. no. 803. T. *Ameriana*.
Auf den *Weiden*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 754. no. 80. T. *Ameria-*
na, der *eigentliche Weidenblattwickler*.

Wiener Schmett. p. 128. C. Gelbe Blattwickler: no.
II. *Sahlweidenwickelraupe* (Sal. Capreae), *Sahl-*
weidenwickler. T. *Americana* L.

Fabric. S. E. p. 647. no. II. *Pyralis Americana.*
Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II.* p. 278. no. 15.

299. *Piceana*, der *Fichtenwickler.*

Müller l. c. p. 726. no. 299. der *Pechflügel.*

Gleditsch Forstwiss. I. p. 503. no. 7. T. *Piceana*,
der *Nadelwickler.*

Clerk Phal. t. 2. f. 9.

Mülleri Faun. Fr. p. 52. no. 459. T. *Piceana.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1502. T. *Piceana.*
Nom. Linn.

300. *Ministrana*, der *Roststrich.*

Müller l. c. p. 726. no. 300. der *Rothrand.*

Wiener Schmett. p. 128. D. Braune Blattwickler:
no. 5. *Unbekannte Raupe; Zimmetbrauner gold-*
gelb gemischter Wickler. T. *Ministrana.*

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 75. Phal.
de *Jardin.*

Fabric. S. E. p. 648. no. 15. *Pyralis Ministrana.*
Nom. Linn.

— *Spec. Insect. II.* p. 279. no. 20.

Clerk Phal. t. 2. f. 12.

301. *Lecheana*, der *I L Wickler.*

Müller l. c. p. 727. no. 301. das I L.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 822. no. 17. die *preußi-*
sche Blattwicklermotte.

Pontoppid. N. H. von Dännem. p. 223. t. 17. Ph.
Tortr. Lecheana.

Wiener Schmett. p. 126. B. *Metallische* Blattwickler:
no. 3.

no. 3. *Ahornwickelraupe* (*Aceris campestris*),
Ahornwickler. T. Lecheana L.

Clerk Phal. t. 10. f. 2.

Fabric. S. E. p. 649. no. 23. Pyralis Lecheana.
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 281. no. 32.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 52. no. 462. T. Lecheana.

— *Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1507. T. Lecheana.*
Nom. *Linn.*

302. *Branderiana.*

β) *Fusca*, der *Braunwickler.*

Müller l. c. p. 727. no. 302. t. 22. f. 14. der Braun-
wickler.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 754. no. 76. T. Fusca,
der braune Blattwickler.

Fabric. S. E. p. 648. no. 13. Pyralis fusca.
Nom. *Linn.*

Clerk Phal. t. 4. f. 7.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1504. T. fusca.
Nom. *Linn.*

303. *Christiernana*, der *blutadrichte Wickler.*

Müller l. c. p. 727. no. 303. die Blutader.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 805. Phal. Christier-
nana.

Wien. Schmett. p. 128. C. Gelbe Blattwickler: no. 9.
Unbekannte Raupe; hochgelber Wickler mit ro-
senrothen Gitterstreifen.

Schäff. Icon. t. 145. f. 4.

Fabric. S. E. p. 649. no. 24. Pyralis Christier-
nana. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 281. no. 33.*

304. *Forskåleana*, das *gelbe Netz.*

Mül.

Müller l. c. p. 727. no. 304. das gelbe Netz.

Wiener Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattwickler: no. 6. Rosenwickelraupe (*Rosae Centifoliae*); Rosenwickler. T. *Forskaleana* L.

Fabric. S. E. p. 652. no. 41. *Pyralis Forskaleana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 285. no. 57.

Clerk Phal. t. 10. f. 2. 6.

Mülleri Faun. Fr. p. 52. no. 463. T. *Forskaleana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 131. no. 1508. T. *Forskaleana*. Nom. *Linn.*

305. *Loeflingiana*, das Doppelkreuz.

Müller l. c. p. 727. no. 305. das Doppelkreuz.

Fabric. S. E. p. 652. no. 42. *Pyralis Loeflingiana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 285. no. 58.

Clerk Phal. t. 10. f. 6.

306. *Hartmanniana*, der Doppelstrich. *)

Müller l. c. p. 728. no. 306. der Doppelstrich.

Faun. Suec. ed. 2. no. 1322.

307. *Bergmanniana*, das vierfache Silberband.

Müller l. c. p. 728. no. 307. das Silberband.

Füesl. schweiz. *Inf.* p. 41. no. 806. Phal. *Bergmanniana*. Selten.

Wiener Schmett. p. 126. B. Metallische Blattwickler, no. 5. Unbekannte Raupe, gelber Wickler mit Silberstrichen. T. *Bergmanniana* L.

Clerk Phal. t. 10. f. 5.

Fabric. S. E. p. 652. no. 43. *Pyralis Bergmanniana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 285. no. 59.

Scop.

*) Nicht abgebildet.

Scop. Entom. carn. p. 232. no. 584. Ph. Bergmanniana.

Alae anticae flavae, nodulis binis, fasciisque argenteis, margine fusco-ferrugineo.

Long. lin. 3½ Lat. 2.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 465. T. Bergmanniana.

— *Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1509. T. Bergmanniana. Nom. Linn.*

Degeer Inf. II. P. I. p. 469. no. 4.

Phalène à antennes filiformes à trompe, à ailes larges d'un jaune orangé luisant avec quatre rayes transverses d'un brun argenté.

Phalène Chappe jaune à rayes argentées.

— *Uebers. II B. I Th. p. 346. no. 4. der Gelbmantel mit Silberstreifen.*

308. *Holmiana*, das silberne Dreyeck.

Müller l. c. p. 728. no. 308. das silberne Dreyeck.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 807. Ph. Holmiana.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 789. no. 17. T. Holmiana, die kleine gelbrothe Obstmotte mit dem dreyeckigen silberfarbigen Rundfleck.

Wien. Schmett. p. 127. B. Metallische Blattwickler: no. 16. Birnwickelraupe (Pyri comm.); Birnwickler. T. Holmiana L.

Fabric. S. E. p. 650. no. 31. Pyralis Holmiana. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 283. no. 41.*

Clerk Phal. t. 10. f. 7.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 73. Phalène des Pommiers.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 466. T. Holmiana.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1510. T. *Holmiana*. Nom. Linn.

309. *Rolandriana*, der *Krummstrich*. *)

Müller l. c. p. 728. no. 309. der *Krummstrich*.

Wiener Schmett. p. 128. C. Gelbe Blattwickler: no.

12. *Weißnießwurzwickelraupe* (Veratri albi);

Weißnießwurzwickler. T. *Rolandriana* L.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 467. T. *Rolandriana*.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1511. T. *Rolandriana*. Nom. Linn.

310. *Solandriana*, der *Birkenwickler*.

Müller l. c. p. 728. no. 310. der *Birkenwickler*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 551. no. 10. T. *Solandriana*, der *Birkenblattwickler*.

Scop. Entom. carn. p. 234. no. 587. T. *Solandriana*.

Macula media, communis, ovata, alterius coloris; alae anticae margo crassior apicem versus fusco-punctatus.

Long. Lin. 5. *Lat.* $2\frac{1}{2}$.

Fabric. S. E. p. 648. no. 17. *Pyrallis Solandriana*.

Alis pallidis, albo-subfasciatis, macula communi dorsali, ferruginea.

— *Spec. Inf.* II. p. 280. no. 23.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1513. T. *Solandriana*. Nom. Linn.

Degeer Inf. I. t. 28. f. 29. 30.

— Ueberf. 3 Quart. p. 20.

— — II. Part. I. p. 485. no. 3.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes

*) Nicht abgebildet.

ailes pendantes d'un brun clair à tache triangulaire blanche sur la femelle & brune sur le male au bord interieur.

Phalène brune à lozange blanche du Bouleau.

— *Uebers.* II B. I Th. p. 358. no. 3. *die braune Birkenphaläne mit dem weissen rautenförmigen Fleck.*

311. *Hastiana*, die weiße Schrägbinde.

Müller l. c. p. 729. no. 311. die *Krummbinde*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 755. no. 82. T. *Hastiana*, die blaugraue *Weidenmotte* mit der schräglaufenden weissen Binde.

Wiener Schmett. p. 126. B. *Metallische* Blattwickler: no. 4. *Bruchweidenwickelraupe* (*Salicis fragilis*); *Bruchweidenwickler*. T. *Hastiana* L.

Clerk Phal. t. 2. f. 7.

Fabric. S. E. p. 650. no. 26. *Pyralis Hastiana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 282. no. 36.

312. *Wahlbomiana*, das Wolkenband. *)

Müller l. c. p. 729. no. 312. das *Wolkenband*.

Wiener Schmett. p. 131. E. *Graue* Blattwickler: no. 20. *Unbekannte Raupe*, *grauer Wickler* mit dunklen Flecken. T. *Wahlbomiana* L.

System. Nat. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 74. *Phalène* de la grandeur d'une petite Mouche, qu'on trouve quelquefois dans les Jardins.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 468. T. *Wahlbomiana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 131. no. 1512. T. *Wahlbomiana*. Nom. *Linn.*

*) Nicht abgebildet.

313. *Lediana*, die *Silberschuppe*.

Müller l. c. p. 729. no. 313. die *Silberschuppe*.

Wiener Schmett. p. 127. B. *Metallische* Blattwickler: no. 13. *Porschwickelraupe* (*Ledi palustris*); *Porschwickler*. T. *Lediana* L.

Fabric. S. E. p. 650. no. 27. *Pyrallis Lediana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 282. no. 37.

Clerk Phal. t. 10. f. 12.

314. *Alstroemeriana*, der *Seitenrostfleck*.

Müller l. c. p. 729. no. 314. der *Braunfleck*.

Wiener Schmett. p. 130. E. *Graue* Blattwickler: no. 18. *Unbekannte Raupe*; *weißgrauer Wickler* mit *Purpurflecken*. T. *Alstroemeriana* L.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 5. der *Braunfleck*. T. *Alstroemeriana* L.

Clerk Phal. t. 10. f. 1.

Fabric. S. E. p. 653. no. 44. *Pyrallis Alstroemeriana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 286. no. 61.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 469. T. *Alstroemeriana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 131. no. 1514. T. *Alstroemeriana*. Nom. *Linn.*

315. *Schalleriana*, die *Rostflügelspitze*. *)

Müller l. c. p. 729. no. 315. der *Rostfleck*.

Fabric. S. E. p. 650. no. 28. *Pyrallis Schalleriana*.

Alis canis; *macula marginali ferruginea*.

Puncta aliquot muricata ad basin alae anticae.

— *Spec. Inf. II.* p. 282. no. 38.

316. *Schrae-*

*) *Nicht abgebildet.*

316. *Schraeberiana*, das weisse Randdreieck. *)

Müller l. c. p. 729. no. 316. das weisse Dreieck.

Fabric. S. E. p. 650. no. 30. *Pyrallis Schreberiana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 282. no. 40.

317. *Logiana*, der Kohlenstaub.

Müller l. c. p. 730. no. 317. der Kohlenstaub.

Wiener Schmett. p. 130. E. Graue Blattwickler: no. 4. Unbekannte Raupe; graulichweisser Blattwickler mit düsterer Aussenrandmakel. T. *Logiana* L.

Fabric. S. E. p. 651. no. 34. *Pyrallis Logiana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 283. no. 45.

Clerk Phal. t. 10. f. 3.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 470. T. *Logiana*.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 130. no. 1515. T. *Logiana*. Nom. *Linn.*

318. *Gouana*, der Schneeflügel. **)

Müller l. c. p. 730. no. 318. das Braunfutter.

Fabric. S. E. p. 651. no. 35. *Pyrallis Gouana*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 283. no. 46.

319. *Brunnichana*, der Rhombus. ***)

Müller l. c. p. 730. no. 319. das Viereck.

Wiener Schmett. p. 132. F. Düstere Blattwickler: no. 2. Unbekannte Raupe; schwärzlicher Wickler mit weislicher Gemeinmakel. T. *Brunnichana* L.

B 3

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 649. no. 21. Pyralis Brunni-
chana. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 281. no. 30.*

320. *Pariana*, die *bleyfahle Binde*.

Müller l. c. p. 730. no. 320. die Bleybinde.

Wiener Schmett. p. 132. F. Düstere Blattwickler:
no. 8. Unbekannte Raupe; düsterer Wickler mit
gezähnten Oberflügeln. T. Pariana L.

Clerk Phal. t. 10. f. 9.

321. *Moderiana*, der *braune Randfleck*. *)

Müller l. c. p. 730. no. 321. der Randfleck.

Linn. S. N. ed. 10. p. 823. Phal. Ruriana.

Fabric. S. E. p. 650. no. 29. Pyralis Moderiana.
Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 282. no. 39.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 130. no. 1516. T. Mode-
riana. Nom. Linn.

322. *Uddmanniana*, der *Quersfleck*. **)

Müller l. c. p. 730. no. 322. der Quersfleck.

Wiener Schmett. p. 130. E. Graue Blattwickler: no.
8. Himbeerwickelraupe (Rubi idaei); Himbeer-
wickler. T. Uddmanniana L.

Fabric. S. E. p. 648. no. 16. Pyralis Uddmannia-
na. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 279. no. 22.*

323. *Cruciana*, der *Bogenfleck*. ***)

Müller l. c. p. 731. no. 323. der Bogenfleck.

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 649. no. 19. Pyralis Cruciana.
 Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 280. no. 26.*

324. *Fabriciana*, das *Punktpaar*.*)

Müller l. c. p. 731. no. 324. das Punktpaar.

Fabric. S. E. p. 653. no. 45. Pyralis Fabriciana.
 Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 286. no. 62.*

325. *Pupillana*, das *Silberauge*.**)

Müller l. c. p. 731. no. 325. das Silberauge.

326. *Heraciana*, der *Kronenwickler*.

Müller l. c. p. 731. no. 326. der Kronenwickler.

Fabric. S. E. p. 655. no. 56. Pyralis Heraciana.
Alis depressis, griseis; anticis subtus fuscis.

— *Spec. Inf. II. p. 288. no. 77.*

Schaeff. Monogr. 1758. t. 2. f. 3. 4.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1517. T. Hera-
cliana. Nom. Linn.

Degeer Inf. I. t. 29. f. 6. 7.

— *II. Part. I. p. 407. no. 5.*

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à
ailes croisées avec plusieurs petits traits noirs,
dont les barbillons en cornes & les pattes poste-
rieures sont très velues.

Phalène à ailes croisées de la Berce.

— *Uebers. II B. I Th. p. 294. no. 5. die Bären-*
klauphalcine mit gekreuzten Flügeln.

Unabgebildete Linnéische Blattwickler.

1. *Fasciana.*

2. *Literana.*

3. *Hartmanniana.*

B 4

4. Ro-

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

4. *Rolandriana*.
5. *Wahlbomiana*.
6. *Schalleriana*.
7. *Schraeberiana*.
8. *Gouana*.
9. *Brunnichana*.
10. *Moderiana*.
11. *Uddmanniana*.
12. *Cruciana*.
13. *Fabriciana*.
14. *Pupillana*.

Neue Arten von Blattwicklern.

1. *Phal. Tortr. Populana*, der *Pappelwickler*.

Linn. Faun. Succ. ed. 2. Sepos. p. 550. no. 2296.

Phalaena feticornis spirilinguis; corniculis duobus subulatis recurvis, alis incumbentibus, nigro cinereoque nebulosis.

Habitat in truncis *Populi tremulae* cujus foliis Larva victitat, eaque convolvit.

Syst. Natur. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 79. Phalène sur les troncs du Peuplier.

2. *Bankiana*, der *Eulenförmige Wickler*.

Fabric. S. E. p. 644. no. 1. Pyralis Bankiana.

Alis albis, macula communi fusca.

Habitat in *Anglia*. Statura fere *Noctuae*.

3. *Hattorfiana*, der *Hattorfwickler*.

Fabric. S. E. p. 647. no. 8. P. Hattorfiana.

Alis fuscis; strigis cinereis, sesquiteritiis.

Habitat in *Germania*.

— *Spec. Inf. II. p. 278. no. 10.*

4. *Decussana*, der *Leipziger Wickler*.

Fabric. S. E. p. 647. no. 10. P. Decussana.

Alis cinereo, nigro argenteoque tenuissime
fasciatis; apice macula subocellari cinerea.

Habitat *Lipsiae*.

— *Spec. Inf. II. p. 278. no. 14.*

5. *Maculana*, der *vierfleckige Wickler*.

Fabric. S. E. p. 647. no. 12. P. Maculana.

Alis anticis fuscis; maculis quatuor dorsalibus
atro-ferrugineis.

In *Sueciae Nemoribus*.

— *Spec. Inf. II. p. 279. no. 16.*

6. *Fusca*, der *Braunling*.

Fabric. S. E. p. 648. no. 13. P. Fusca.

Alis anticis fuscis, immaculatis.

— *Spec. Inf. II. p. 279. no. 17.*

*Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 345. no. 1321. Ph. T.
fusca.*

Alis superioribus fuscis.

In *Nemoribus*.

Clerk Phal. t. 2. f. 1. Ph. Fusca.

7. *Laetana*, der *Schwarzpunkt*.

Fabric. S. E. p. 649. no. 20.

Alis anticis fuscescentibus; margine exteriori
baseos niveo, nigro punctato.

In *Sueciae Nemoribus*.

— *Spec. Inf. II. p. 281. no. 29.*

8. *Squamana*, der *Schuppenwickler*.

Fabric. S. E. p. 651. no. 36.

Alis virescentibus, scabris.

In *Anglia*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 284. no. 50.

9. *Emargana*, der *Dickrand*.

Fabric. S. E. p. 651. no. 37.

Alis subcaudatis, flavis, fusco-reticulatis, fasciaque lata fusca, margine crassiori emarginato.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 284. no. 52.*

10. *Caudana*, der *Schwanzwickler*.

Fabric. S. E. p. 651. no. 38.

Alis subcaudatis griseis; margine interiore fulvo; exteriori emarginato.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 284. no. 53.*

11. *Quercana*, der *sächsische Eichenwickler*.

Fabric. S. E. p. 652. no. 39.

Alis anticis flavis; maculis duabus costalibus sulphureis.

In *Saxoniae Quercu*.

Wiener Schmett. p. 128. C. Gelbe Blattwickler; no.

13. *T. Fagana*, *Büchenwickler*. Tab. I. a. f. 6.
b. f. 6.

12. *Ocellana*, der *geäugte Wickler*.

Fabric. S. E. p. 652. no. 40.

Alis cinereis; litura media sanguinea; puncto albido.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 285. no. 56.*

13. *Conwagana*, der *Silberpunkt*.

Fabric. S. E. p. 653. no. 46.

Alis ferrugineo-fuscis, argenteo-punctatis
maculaque dorsali flavicante.

In *Angliae* Nemoribus.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 286. no. 63.

14. *Aurana*, der Goldfleck.

Fabric. S. E. p. 653. no. 48.

Alis fuscis; maculis duabus aureis.

In *Anglia*.

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 66.

15. *Rivellana*, die Spaltstreife.

Fabric. S. E. p. 654. no. 50.

Alis fuscis; fasciis tribus cinereis; secunda introrsum bifida.

In *Sueciae* Nemoribus.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 69.

16. *Dorsana*, der Rückenbogen.

Fabric. S. E. p. 654. no. 52.

Alis fuscis, arcu dorsali albo apiceque strigis argenteis.

In *Lipsiae* hortis.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 71.

Geoffr. Inf. II. p. 189. no. 16.

Tinea alis nigris, superioribus macula quadrata alba, ex quatuor lineolis albis transversis composita.

La Teigne à quarrure.

Long. $2\frac{1}{2}$ Lign.

17. *Strigana*, der Rost- und Silberfarbig gestreifte Wickler.

Fabric. S. E. p. 654. no. 53.

28. *Lepidoptera*. 233. *Phalaena Tortrix*.

Alis flavescentibus, apice strigis ferrugineis
argenteisque; puncto triplici atro.

In *Sueciae* Nemoribus.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 72.

18. *Depressana*, der *Hangeflügel*.

Fabric. S. E. p. 655. no. 57.

Alis depressis, fuscis, capite, thoraceque ni-
veis.

Habitat in *Suecia*.

— Spec. Inf. II. p. 289. no. 78.

19. *Koenigiana*, der *ostindianische braungestäubte*
Wickler.

Fabric. S. E. p. 653. no. 47.

Alis fulvis, apice nigris, fulvo-maculatis.

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 65.

20. *Leeana*, der *Bleywickler*.

Fabric. Gen. Inf. c. *Mantiss*. p. 292. no. 7-8.

Pyralis alis plumbeis; lineolis tribus macu-
laque magna apicis ferrugineis.

— Spec. Inf. II. p. 278. no. 9. *Pyralis Plumba-*
na. Habitat *Hamburgi*.

21. *Pallidana*, der *blaßgelbe Wickler*.

Fabric. *Mantiss*. p. 292. no. 9-10.

Alis pallide flavis; strigis duabus obliquis fer-
rugineis.

— Spec. Inf. II. p. 278. no. 12.

Habitat *Hamburgi*.

22. *Servana*, der *Zentralfleck*.

Fabric. *Mantiss*. p. 292. no. 15-16.

Alis

Alis anticis fuscescentibus; macula centrali
fulva, basi flavis.

— Spec. Inf. II. p. 279. no. 21.
In *Germania*.

23. *Asperana*, der *Rauhflügel*.

Fabric. Mantiss. p. 292. no. 35-36.

Alis anticis, basi albis, apice fuscis *scabris*.

— Spec. Inf. II. p. 284. no. 48.
Habitat *Hamburgi*.

24. *Duplana*, der *Doppelpunkt*.

Fabric. Mant. p. 293. no. 35-36.

Alis anticis pallidis; punctis duobus approxi-
matis baseos nigris.

— Spec. Inf. II. p. 284. no. 49.
Habitat *Kiliae*.

25. *Schestediana*, der *Schwarzflügel*.

Fabric. Mant. p. 293. no. 47-48.

Alis atris; macula magna communi, strigis
atomisque coerulescenti argenteis.

— Spec. Inf. II. p. 286. no. 64.
Habitat *Kiliae* in *Alnetis*.

26. *Schulziana*, der *Silberpunkt*.

Fabric. Mant. p. 293. no. 49-50.

Alis testaceis fasciis punctisque argenteis, me-
dioque litura atra.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 68.
In *Germania*.

27. *Lundana*, die *Goldspitze*.

Fabric. Mant. p. 294. no. 53-54.

30 *Lepidoptera. 233. Phalaena Tortrix.*

Alis basi fuscis linea semicirculari pallida,
apice auratis; margine crassiori nigro pallido-
que striato.

— Spec. Inf. II. p. 287. no. 73.
In *Kiliae Quercu*.

28. *Applana*, der dreyfache Mittelpunkt.

Fabric. Mant. p. 294. no. 56-57.

Alis depressis fuscis; punctis tribus centrali-
bus albis.

— Spec. Inf. II. p. 288. no. 76.
Habitat *Kiloniae*.

29. *Bankiana*, der englische Waldwickler.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 275. no. 1.

Alis fuscis, fasciis duabus niveis, posteriore
unidentata.

In *Angliae Sylvis*.

30. *Smeathmannia*, die abgebrochene Binde.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 278. no. 13.

Alis exalbidis, fasciis duabus obliquis fuscis,
antere abbreviata, posteriore interrupta.

In *Anglia*.

31. *Forsterana*, der doppelte Randfleck.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 279. no. 18.

Alis anticis obscure cinereis, maculis duabus
marginalibus fuscis.

In *Angliae Nemoribus*.

32. *Stroemiana*, der doppelte Rückenfleck.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 280. no. 24.

Alis fuscis, maculis duabus dorsalibus cine-
reis.

In

In Germania.

33. *Cinerana*, der *Afchwickler*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 281. no. 27.

Alis exalbido cinereis immaculatis, capite fulvo.

In Germania.

34. *Obliquana*, die *Schrägstreife*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 281. no. 28.

Alis cinereis, fasciis obliquis fulvis, albo-marginatis.

In Anglia.

35. *Fasciana*, die *Braunbinde*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 282. no. 35.

Alis anticis obscure cinereis, fascia media lituraque apicis fuscis.

In Angliae hortis.

36. *Ilicana*, der *schwarze Mittelpunkt*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 283. no. 44.

Alis anticis fusco-cinereis, punctis fuscis, centrali solitario atro.

In Angliae hortis.

37. *Tunbergiana*, der *schwarze Vierpunkt*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 284. no. 47.

Alis anticis cinereis, punctis quatuor elevato fasciculatis atris.

In Germania.

38. *Scabrana*, der *Höckerflügel*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 284. no. 54.

Alis anticis cinereis fusco subfasciatis scabris, margine exteriori postice exciso.

In

In Angliae Quercu.

39. *Teatiana*, der vierfache schwarze Randpunkt.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 286. no. 60.

Alis anticis griseis, macula punctisque duobus centralibus nigris.

In Angliae Nemoribus.

40. *Bicolorana*, der Weißgrünwickler. *)

Füßl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 798. der Weißgrünwickler.

Röfels Insektenbel. IV. p. 73. t. 10. die glatte, grüne, mit einer kleinen Rückenwarze versehene, auf dem Eichenlaub lebende Raupe, mit ihrem besonders schönen grünen Papilion.

Wiener Schmett. p. 125. A. Grüne Blattwickler: no. 1. Eichenwicklerraupe (Quercus Roboris); Eichenwickler. T. Quercana.

Degeer Inf. Tom. I. Mém. 2. p. 58. t. 3. f. 1.

— *Tom. II. P. I. p. 410. no. 1.*

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes rabatues en toit, dont les supérieures sont vertes à deux lignes obliques jaunâtres, & les inférieures blanches.

Phalène verte bilinaire.

— *Uebers. II B. I Th. p. 296. no. 1. die grüne zweylinichte Phaläne.*

Geoffr. Inf. II. p. 172. no. 124.

Phalaena feticornis spirilinguis, humeris latis, alis viridibus, linea duplici transversa albida.

La Chappe verte à bande.

Long. 9 Lign.

Réaum. Inf. I. t. 39. f. 10 - 14.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 276. no. 4. Pyralis prasinana.

Alis

*) Vergl. mit *Prasinana* L. no. 285. welche *Fabric. Spec. Inf. II. p. 276. no. 5. Fagana* nennet,

Alis anticis viridibus, strigis *duabus* obliquis flavicantibus, posticis albis.

Habitat in *Alno, Quercu* Europae.

Larva viridis, linea laterali flavicante, segmento secundo dorsi tuberculato.

Pupa viridis, linea dorsali atra.

41. *Podana*, der *Oker gelbe Wickler*.

Scop. Ent. carn. p. 232. no. 583.

Alae ochraceae; anticae cinnamomeae; atomis strigaeque media fuscescentibus, apice caudatis.

In *Rhododendro ferrugin.*

Long. lin. $5\frac{1}{2}$. *Lat.* 3.

42. *Rubiana*, der *Strauchwickler*.

Scop. Ent. carn. p. 233. no. 585.

Alae fuscescentes; anticae supra cinerascetes; macula communi postica subovata brunea, macula apicis punctisque tribus posticis crassiori margini impositis bruneis.

Long. lin. $4\frac{1}{4}$. *Lat.* $2\frac{1}{3}$.

An *Viduana Müller*i? *Zool. Dan. Pr.* p. 132. no. 1523.

Alis albo-cinereis, fasciis obliquis, maculaque marginali nigro punctata griseis.

43. *Fasciana*, die *Weißbinde*.

Linn. Faun. Suec. ed. 2. p. 342. no. 1304.

Alis fusco-cinerascetibus; fascia alba.

In *Pomariis*.

Scop. Ent. carn. p. 233. no. 586.

Alae anticae supra fusco glaucoque variae; fascia lata albida postica.

Long. lin. 4. *Lat.* $2\frac{1}{2}$.

44. *Cervana*, der *Hirschhornfarbige Wickler*.

Scop. Ent. carn. p. 234. no. 588.

Alae anticae *cervinae*; limbo ferrugineo et fusco-punctato; fascia fuscescente punctisque (3-4) glaucis variegata.

In *Ericetis*.

Long. lin. 5. Lat. $2\frac{1}{2}$.

45. *Lambergiana*, der *Rindenfarbige Wickler*.

Scop. Entom. carn. p. 234. no. 589.

Alae anticae *corticinae*; strigis transversis punctisque quatuor plumbeis.

Circa *Idriam*.

Long. lin. 4. Lat. $2\frac{1}{4}$.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1522. T. Lambergiana.

Alis nigricantibus maculis obscuris plumbeis.

46. *Wulfeniana*, der *Schwärzling*.

Scop. Ent. carn. p. 235. no. 590.

Nigricans, alis anticis plumbeo-punctatis; subtus puncto albo, quo posticae utrinque notatae.

Long. lin. 3. Lat. $1\frac{1}{2}$.

Circa *Idriam*.

Mülleri Zool. Dan. Prodr. p. 132. no. 1521. T. Wulfeniana.

Alis nigricantibus; anticis punctis argenteis; posticis litura utrinque nivea.

47. *Rufana*, der *Fuchs*.

Scop. Ent. carn. p. 235. no. 591.

Alae anticae ferruginae, glauco-punctatae.

In *Salicetis*.

Long. $4\frac{1}{2}$. Lat. $2\frac{1}{3}$.

48. *Plum-*

48. *Plumbana*, der *Bleystrich*.

Scop. Ent. carn. p. 235. no. 592.

Alae anticae basi fuscescentes; posticae ferrugineae, *lituris transversis hamatis plumbeis*, punctisque (2 - 3) nigris marginalibus ad angulum posticum.

In *Herbidis*.

Long. lin. 4 $\frac{1}{2}$. Lat. 2 $\frac{1}{3}$.

49. *Rusticana*, der *Landmann*.

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 593.

Alae anticae canescentes; maculis obsoletis fasciaque pallide caffeat.

Circa Tuguria et possessiones Rusticorum.

Long. 4 lin. Lat. 2.

50. *Miscellana*, der *Mischling*.

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 594.

Alae anticae cervinae fusco-punctatae; strigis transversis interruptis plumbeis, fasciaque media fuscescente, plumbeo puncto notata.

In *Nemoribus, hortis, pomariis*, Majo.

Long. lin. 4. Lat. 2.

51. *Montana*, der *Bergmann*.

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 595.

Alae anticae fuscae, macula communi media margineque crassiore postice ferrugineis, strigis binis posticis obliquis fimbriaque plumbeis.

In *montanis Carnioliae*.

Long. lin. 3. Lat. $\frac{1}{2}$.

Wien. Schmett. p. 127. B. Metallichte Blattwickler:

no. 14. *Unbekannte Raupe; schwärzlicher Wickler*, mit gelber Gemeinmakel, und silbernem Unterrande. T. *Montana Scop.*

36 *Lepidoptera. 233. Phalaena Tortrix.*

52. *Cana*, der *kleine Esel*.

Scop. Ent. carn. p. 236. no. 596.

Alae anticae canescentes, fronte atomisque cervinis.

Inter *Corylos*.

Long. lin. 6. Lat. 3.

53. *Pedana*, der *Nebelstügel*.

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 597.

Alae anticae cinereo-fuscoque nebulosae, apice strigis obliquis ferrugineis.

Inter *frutices*.

Long. lin. 5. Lat. 2½.

54. *Umbriana*, der *Nachtschatten*.

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 598.

Umbrina; alis anticis cinereis, fascia punctisque marginalibus fuscescentibus.

In *Pratis*.

Long. lin. 4. Lat. 2.

55. *Formosana*, der *Obstfreund*.

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 599.

Alae anticae nigro-corticinoque variae, strigis tribus submarginalibus obliquis plumbeis, punctisque albis marginalibus.

Circa *Idriam*, in *Pomariis*.

Long. lin. 4. Lat. 2.

56. *Rivulana*, die *Bachlinie*.

Scop. Ent. carn. p. 237. no. 600.

Alae anticae murinae; fascia rivulisque posticis, albidis.

In *Sylvis*.

Long. lin. 4. Lat. 2.

Wien.

Wien. Schmett. p. 131. E. Graue Blattwickler: no. 21. Unbekannte Raupe; grauer Wickler mit düstern Schrägstreifen. T. Rivulana Scop.

57. *Gramineana*, der *Grasling*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 601.

Alae anticae atomis fasciisque binis obsoletis fuscescentibus.

In herbidis collibus.

Long. lin. $3\frac{1}{2}$. Lat. $1\frac{3}{4}$.

58. *Capillitiana*, der *Buschkopf*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 602.

Alae anticae subferrugineae; punctis marginalibus capite palpisque albidis.

In Sylvestribus locis.

Long. lin. 4. Lat. 2.

59. *Osseana*, der *Beinfarbige Wickler*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 603.

Alae anticae osseae; atomis fuscis, punctoque apicis fuscescente.

In Herbidis.

Long. lin. $3\frac{1}{2}$. Lat. $1\frac{1}{2}$.

60. *Pyraliana*, der *Lichtfalterartige Wickler*.

Scop. Ent. carn. p. 238. no. 604.

Alae anticae ferrugineae; limbo obscuriore, fasciisque binis fuscis.

In Sylvis.

Long. lin. 3. Lat. $1\frac{1}{2}$.

61. *Revoyana*, der *Krummrand*.

Scop. Ann. hist. nat. 5. p. 116. no. 130.

Alis superioribus glauco-virentibus, margine
exteriore notabiliter curvo.

Circa *Schemnitz*.

Alae anticae *Longit.* lin. 4-5.

Comes Petr. *Revay de Reva*.

62. *Schiffermulleriana*, der *Schiffermüllersche Wickler*.

Scop. Ann. hist. nat. 5. p. 117. no. 131.

Parva; alis cinereo-murinoque variis.

In *hortis Schemnitzensibus*.

Alae anticae *Long.* lin. 3-4.

63. *Hochenwartiana*, der *Hochenwartische Wickler*.

Scop. Ann. hist. nat. 5. p. 117. no. 132.

Alis anticis fuscis, macula magna, lunata,
communi, media.

Schemnitzii in *hortis et pratis*.

Alae anticae *Long.* lin. 5-6.

64. *Cruciana*, das *Rostkreuz*.

Scop. Ann. hist. nat. 5. p. 118. no. 133.

Alae anticae flavae; singula cruce ferruginea.

Circa *Schemnitz* in *pratis*.

Alae anticae *Long.* lin. 4-5.

65. *Cingulana*, der *Gürtelwickler*.

Scop. Ann. hist. nat. 5. p. 118. no. 134.

Parva; murina; fascia alba supra basin.

Schemnitzii in *pratis*.

Alae anticae *Longit.* lin. 3-4.

66. *Miana*, der *Silberflügel*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 472.

Alis omnibus argenteis superioribus limbo fusco; lineaque undulata argentea.

In *Horto*.

— Zool. Dan. Prodr. p. 131. no. 1518.

67. *Koenigiana*, der *Grauflügel*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 473.

Alis omnibus griseis politis; inferioribus strigata undulata.

— Zool. Dan. Pr. p. 131. no. 1519.

In *Arvis*.

68. *Albana*, der *Weißling*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 53. no. 474.

Alis omnibus albis; inferioribus apice fascia fusca.

In *Arundineto*.

— Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1520.

69. *Penniferana*, der *Federträger*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1527.

Alis sexpennibus cinereis, fasciis duabus punctisque marginalibus nigris.

Frisch Inf. III. p. 20. no. 10. t. 7. der 3ten Platte. f. 1-5.

Das kleine *Kaprifoliumblüträuplein* mit seinem Zwiefalter.

70. *Aureana*, der *Goldrand*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1528.

Alis omnibus utrinque fuscis, margineque postico latiusculo, aureo.

71. *Miniana*, der *Röthling*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1525.

Alis superioribus miniatis; nodulo disci candido, triangulo marginali rufo.

72. *Circulana*, der *Zirkelwickler*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1526.

Alis fulvescentibus; macula dorsali communi ferruginea, striga alba cincta.

73. *Graminana*, der *Graswickler*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 132. no. 1529.

Alis omnibus utrinque cinereo-fuscis; basi maculis, disco lineis, altera bifida, altera curvata, transversis, albis.

74. *Olivana*, *Olivengrüner Wickler* mit 2 silbernen *Schrägestreifen*.

Wien. Schmett. p. 126. B. *Metallische Blattwickler*: no. 1. *Unbek. R.*

75. *Pilleriana*, *goldner W.* mit 2 braunen *Schrägestreifen*.

Wien. Schmett. p. 126. B. no. 2. *Unbekannte R.*

76. *Baumanniana*, *gelber Oranienstreifiger W.* mit *Silberstrichen*.

Wiener Schmett. p. 126. B. no. 6. *Unbek. R.*

77. *Tesserana*, *gelber rothfleckichter W.* mit *Silberstrichen*.

Wien. Schmett. p. 126. B. no. 7. *Unbek. R.*

Geoffr. Ins. II. p. 186. no. 10.

Tinea aurata, alis superioribus cruce decussata fusco-rubra.

La Teigne à croix de saint André.

Long. $2\frac{3}{4}$ lign.

78. *Badiana*, graugelber, rothbraunfleckichter *W.* mit Silberstrichen.

Wien. Schmett. p. 126. no. 8. Unbek. R.

79. *Woerberiana*, brauner *W.* mit Rothgold und Silber gezeichnet.

Wien. Schmett. p. 126. no. 9. Unbek. R.

80. *Penkleriana*, grau - und gelbgemischter *W.* mit Silberstreifen.

Wien. Schmett. p. 126. no. 12. Unbek. R.

81. *Lunulana*, braunschwarzer *W.* mit einem weißen Gemeinmonde und matten Silberstrichen.

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 15. Unbek. R.

82. *Micana*, graubräunlicher und schwarzgemischter *W.* mit Silbersprecken.

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 17. Unbek. R.

83. *Argentana*, ganz silberglänzender *W.*

Wien. Schmett. p. 127. B. no. 18. Unbek. R.

84. *Suttneriana*, bleichgelber *W.* mit einem Mittelpunkt.

Wien. Schmett. p. 127. C. Gelbe Blattw. no. 2. Unbek. R.

85. *Costana*, Ledergelber *W.* mit zwey braunen Aussenrandmakeln.

Wien. Schmett. p. 127. C. no. 5. Unbek. R.

86. *Mediana*, Okergelber und braungezeichneter *W.*

Wien. Schmett. p. 128. C. Unbek. R.

87. *Viburnana, Mehlbaumwickler.*

*Wien. Schmett. p. 128. C. no. 15. Mehlbaumwickler-
leraupe (Viburni Lantanae).*

88. *Buoliana, Oranienfarbener Silberweißgeigitterter W.*

Wien. Schmett. p. 128. C. no. 16. Unbek. R.

89. *Ferrugana, Rostbrauner Wickler.*

*Wien. Schmett. p. 128. D. Braune Blattwickler:
no. 1. Unbek. R.*

90. *Heparana, Leberfarbiger W. mit dunklen Streifen.*

Wien. Schmett. p. 128. D. no. 3. Unbek. R.

Geoffr. Inf. II. p. 169. no. 118.

Phalaena feticornis spirilinguis, humeris latis, ferrugineo-fusca, fasciis tribus transversis saturationioribus.

La Chappe brune.

Long. 4 lign.

*Degeer Inf. Tom. I. Mém. 13. p. 409. 410. t. 27.
f. 9. 10.*

— *II. Part. I. p. 468. no. 2.*

Phalène à antennes filiformes à trompe, à ailes larges d'un brun de Café, à bande oblique obscure, à barbillons droits & allongés.

Phalène chappe brune du Lilas.

— *Uebers. II B. I Th. p. 345. no. 2. die braune Mantelphaläne auf den Fliedern.*

Hellgrüne sechzehnfüßige Raupe mit grünem Kopfe.

91. *Fulvana, Specklilienwickler.*

Wien.

*Wien. Schmett. p. 128. D. no. 6. Specklilienwickler-
raupe (Lonicerae Periclymeni).*

92. *Rhombana, gelbbrauner W. mit zwey düstern
Flecken.*

Wien. Schmett. p. 128. D. no. 7. Unbek. R.

93. *Rufana, gelbröthlicher W. mit düsterer Außen-
randmakel.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 8. Unbek. R.

94. *Lipsiana, Leberbrauner W. mit weißen Mittel-
punkten.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 9. Unbek. R.

95. *Cristana, dunkelbrauner W. mit weißem Innen-
rande.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 10. Unbek. R.

96. *Scopoliana, Caffebrauner W. mit 2 weißglänzen-
den Bogenflächen.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 11. Unbek. R.

97. *Laevigana, hellbrauner W. mit dunkler Mitte.*

Wiener Schmett. p. 129. D. no. 12. Unbek. R.

98. *Pusillana, rothbrauner W. mit weißgestricheltem
Außenrande.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 13. Unbek. R.

99. *Striana, bräunlichter W. mit düstern Streifen.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 14. Unbek. R.

100. *Hohenwartiana, graubrauner (auch goldgel-
ber) W. mit silberfarbigen Untenrandhäkchen.*

Wien. Schmett. p. 129. D. no. 15. Unbek. R.

101. *Politana*, glänzender goldbräunlicher *W.* ohne Makel.

Wien. Schmiett. p. 129. D. no. 16. Unbek. R.

102. *Mitterbacheriana*, Oraniengelb- und rothbrauner *W.* mit weißen Strichelchen.

Wien. Schmiett. p. 129. D. no. 17. Unbek. R.

103. *Tenerana*, weißlicht- und Zimmetbrauner *W.* mit feinen Punkten.

Wien. Schmiett. p. 129. D. no. 18. Unbek. R.

104. *Permixtana*, blaßbuntfarbiger *W.*

Wien. Schmiett. p. 129. D. no. 19. Unbek. R.

105. *Sparsana*, grauer röthlich gezeichneter *W.*

Wien. Schmiett. p. 129. E. Graue Blattw. no. 1. Unbek. R.

106. *Succedana*, hellgrauer *W.* mit bräunlichten Punkten und weißen Strichelchen.

Wien. Schmiett. p. 129. E. no. 2. Unbek. R.

107. *Ciniflana*, weißer *W.* mit braunem Querbande und Flecken.

Wien. Schmiett. p. 129. E. no. 3. Unbek. R.

108. *Dilutana*, röthlichweißer *W.* mit blaßfarbigen Flecken.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 5. Unbek. R.

109. *Variiegana*, gelblichtweißer *W.* mit düsterer Innenrandmakel und buntem Untenrande.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 6. Unbek. R.

110. *Ocellana*, weißlichter Wickler mit grauem Rücken und Innenwinkel.

Wien.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 7. Unbek. R.

111. *Asperana*, grauer *W.* mit bunthökrichten Flügeln.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 8. Unbek. R.

112. *Treueriana*, weissgrauhökrichter schwarzgefleckter (auch grünlichweisser) *W.*

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 10. Unbek. R.

113. *Pinana*, Fichtenwickler.

*Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 11. Fichtenwickler-
raupe (Pini Piceae etc. Clus.).*

114. *Scabrana*, grauer *W.* mit düstern Hökern des Rückenwinkels.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 12. Unbek. R.

115. *Punctulana*, röthlichgrauer *W.* mit erhobenen schwarzen Punkten.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 13. Unbek. R.

116. *Conspersana*, Perlfarbener *W.* mit blaugrauen Punkten und Strichelchen.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 14. Unbek. R.

117. *Strigulana*, Lichtgrauer dunkelspreckichter *W.*

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 15. Unbek. R.

118. *Steinkellneriana*, grauer *W.* mit schwarzem S.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 16. Unbek. R.

119. *Revayana*, grauer *W.* mit rothem Mittelpunkt.

Wien. Schmiett. p. 130. E. no. 17. Unbek. R.

120. *Tumidana*, Lichtgrauer *W.* mit zwey röthlichen Schwellen.

Wien.

46. *Lepidoptera*. 233. *Phalaena Tortrix*.

Wien. Schmett. p. 130. E. no. 18. *Unbek. R.*

121. *Undulana*, grauer weislichtgeschlängelter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 22. *Unbek. R.*

122. *Stagnana*, grauer lichtgewässerter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 23. *Unbek. R.*

123. *Comitana*, dunkelgrauer weisgeschlängelter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 24. *Unbek. R.*

124. *Affaelana*, braungrauer weisgefleckter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 25. *Unbek. R.*

125. *Botrana*, Weintraubenwickler.

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 26. Weintraubenwick-
lerraupe (Botri).

126. *Achatana*, grauer *W.* mit rothbraunen Flecken.

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 27. *Unbek. R.*

127. *Mygindiana*, grauer, abwärts feuerrothgestrich-
ter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 28. *Unbek. R.*

128. *Corticana*, dunkelgrau und weisgefleckter *W.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 29. *Unbek. R.*

129. *Scutulana*, grauer *W.* mit zwei weislichen Flä-
chen.

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 30. *Unbek. R.*

130. *Linneana*, weislichgrauer *W.* mit einem schwar-
zen Mittelstrichelchen.

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 31. *Unbek. R.*

131. *Similana*, grauer *W.* mit zwei weislichen Flächen
und gestrichtem Aussenrande.

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 32. *Unbek. R.*

132. *Sinuana*, *Mäusefahler W.* mit einer weissen Innenrandmakel.

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 33. Unbek. R.

133. *Roborana*, *Eichenbuschwickler.*

Wien. Schmett. p. 131. E. no. 34. Eichenbuschwicklerraupe (*Quercus Rob.*)

134. *Tripunctana*, *schwarzgrauer W.* mit weissem Mittelraume und drey schwarzen Pünktchen.

Wiener Schmett. p. 131. E. no. 35. Unbek. R.

135. *Profundana*, *düftergemischter W.* mit weislicher Gemeinmakel.

Wien. Schmett. p. 132. F. düstere Blattwickler: no. 1. Unbek. R.

136. *Trauniana*, *schwarzer W.* mit hochgelber Gemeinmakel.

Wien. Schmett. p. 132. F. no. 3. Unbek. R.

137. *Iacquiniana*, *braunschwarzer W.* mit bleichgelbem Gemeinbände.

Wien. Schmett. p. 132. F. no. 4. Unbek. R.

138. *Furvana*, *grauschwarzer W.* mit lichtgezeichnetem Untenrande.

Wien. Schmett. p. 132. F. no. 5. Unbek. R.

139. *Irundana*, *mattschwarzer weislich gewässerter W.* mit weissem Mittelpunkte.

Wien. Schmett. p. 132. F. no. 6. Unbek. R.

140. *Urticana*, *Nesselwickler.*

Wien. Schmett. p. 132. F. no. 7. Nesselwicklerraupe (*Urticae dioicae*).

An Degeer Inf. II. Part. I. p. 470. no. 5.

Phalène Chappe à ailes béantes de l'Ortie?

— Tom. I. Mém. 13. p. 413. t. 28. f. 1. 2. 9. 10.

— Uebersf. II B. I Th. p. 473. no. 5. die Mantelpha-

phaläne auf den Nesseln mit aus einander stehenden Flügeln.

141. *Alniana, Erlenwickler.*

Wien. Schmett. p. 132. F. no. 8. Erlenwicklerraupe (Betulae Alni).

142. *Fuligana, ganz düsterer Wickler.*

Wien. Schmett. p. 132. F. no. 9. Unbek. R.

143. *Literana, hochgrüner schwarzgezeichneter W.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. A. no. 5. Unbek. R.

144. *Decimana, gelber kreuzmaklichter W. mit Silberstrichen.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. Unbek. R.

145. *Trigonana, Dottergelber W. mit bräunlichem Dreyecke.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. C. Unbek. R.

146. *Steineriana, Skorpionsfennenwickler.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. C. Skorpionsfennenwicklerraupe (Coronillae Emeri).

147. *Hermanniana, Brombeerwickler.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. D. Brombeerwicklerraupe (Rubi fruticosi).

148. *Pasquayana, Elsebeerwickler.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. Elsebeerwicklerraupe (Crataegi torminalis).

149. *Helvolana, Weißwurzwickler.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. Weißwurzwicklerraupe (Convallariae Polygonati).

150. *Gerningana, goldbrauner schwarzrothstreifichter W.*

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. D. Unbek. R.

151. *Cam-*

151. *Campoliliana*, weißer, braun- und gelbsprenklichter W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. E. Unbek. R.

152. *Fluidana*, weißer, braunwellenstreifichter W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. Unbek. R.

153. *Lacunana*, bleichgrauer braunmaklichter W.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. Unbek. R.

154. *Salviana*, Salbeywickler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. F. Salbeywickler-
raupe (*Salviae pratensis*).

155. *Merianana*, der hohe Brustschildwickler.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 470. no. 6. t. 9.
f. 16. 19.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à corcelet huppé, à ailes larges d'un brun verdâtre avec deux cercles ovales & trois lignes transverses grises.

Phalène chappe à corcelet à arrête.

Chenilles rases vertes à points blancs & à cinq rayes longitudinales blanches, dont celle du milieu est large.

— De grandeur mediocre.

— *Uebersf. II B. I Th.* p. 473. no. 6. t. 9. f. 16. 19.

Die Mantelphaläne mit einem kantigen Brust-
schilde.

Merian. Inf. Eur. t. 87.

156. *Mumetes*, der Sichelflügel.

Cramer Pap. exot. I. p. 128. t. 82. Fig. A. *Surin.*

Alis furvis; anticis falcatis flavo-lineatis.

157. *Marriana*, das braune Dreyeck.

Cramer Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. F.

Alis *anticis* sinuosis variegatis; maculis fuscis triangularibus; *posticis* luteis.

158. *Renselariana*, das gelbe Bächlein.

Cramer Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. H.

Alis *anticis* flavo-rivulatis, maculis quatuor fulvis; *posticis* fusco-canis.

159. *Crameriana*, der Buckelflügel.

Cramer Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. I.

Alis *anticis* gibbosis, margine rutilantibus, medio bilineatis; *posticis* fusco-canis.

160. *Seppiana*, der fleischfarbige Wickler.

Cramer Pap. exot. IV. p. 135. t. 359. Fig. H.

Alis concoloribus *incarnatis*; *anticis* margine exteriori fusco-maculato.

161. *Holthufiana*, der Pommeranzenrand.

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. H.

Alis flavicantibus; *anticis* marginibus rutilantibus nigroque punctatis; *posticis* margine aurantiaco.

162. *Meyeriana*, der Flimmerrand.

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. K.

Incarnata; marginibus nigro-ciliatis.

163. *Gladbaghiana*, das Doppelstäbchen.

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. L.

Alis *anticis* rubro-variegatis; *binis* flavo-rubroque *bacillis*.

164. *Demarriana*, der *Schneeflügel*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. M.

Nivea; anticis rivulis transversis flavis sinuosis.

165. *Fuesliniana*, der *Röthling*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. E.

Rutilans, atro-punctata.

166. *Albertiana*, die *gelbweisse Neune*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. H.

Furva; alis anticis binis numeris 9 flavo-albis.

167. *Burmanniana*, der *Mondrand*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. H.

Lutescens; margine anticarum atro-lunato.

168. *Gerningiana*, der *Randpunkt*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. I.

Testacea; punctulis nigris marginalibus.

169. *Walchiana*, der *Weissrand*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 191. t. 384. Fig. F.

Alis olivaceo-micantibus, margine anteriore niveis.

170. *Thunbergiana*, der *Bräunling*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. H.

Alis anticis fuscis, brunneo-maculatis.

171. *Klemaniana*, der *Weisspunkt*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. I.

52 *Lepidoptera. 233. Phalaena Pyralis.*

Alis olivaceo - fuscis; albo - punctatis, posticis
concoloribus brunneis.

172. *Esperiana*, der *Schwarzstrich*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. K.

Alis concoloribus, fusco - rubris, nigro - litur-
ratis.

173. *Clerkiana*, der *weisse Dreyzack*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. M.

Alis anticis canescentibus, alba tripude mar-
ginali; posticis furvis, nigro - lineatis.

V. *Lichtmücken*, Pyralides. (*Zünsler*, Pin-
ceurs.)

327. *Farinalis*, die *Mehlmücke*.

Müller L. N. S. 5 Th. I B. p. 731. *Feuerwürm-*
lein p. 732. no. 327. der *Polirflügel*.

Füesl. schweiz. Inf. p. 41. no. 808. Ph. *Pyralis*.

Wien. Schmett. p. 123. B. *Kurzschnauzigte Züns-*
ler, Ph. Pyr. *Brevipalpes*: no. 33. *Mehlzünsler-*
raupe (*Farinae culinaris*). Pyr. *Farinalis* Linn.

Geoffr. Inf. II. p. 167. no. 113.

Phalaena seticornis spirilinguis triangularis,
alis superioribus fusco - purpureis; fascia trans-
versa albido - ferruginea, abdomen supra proten-
dens.

La *Phalène* à ventre relevé.

Long. $4\frac{1}{2}$ Lign.

Réaum. Inf. II. t. 2. f. 4.

Bekm. Ep. S. L. p. 167. no. 327. Ph. Pyr. *Farinalis*.

Blumenbachs Handb. der N. G. p. 372. no. 18. Ph.
Pyr. *Farinalis*.

Scop. Entom. carn. p. 240. no. 608.

Alae

Alae anticae basi et limbo caryophyllinis,
media parte pallide cervina, marginibus repandis albidis.

Long. $5\frac{1}{2}$ lin.

Poda Mus. graec. p. 94.

Schaeff. Icon. t. 95. f. 8. 9.

Fabric. S. E. p. 641. *Phalaena* alis forficatis no. 112.

Ph. *Farinalis*.

Palpis recurvatis, alis politis, lutescentibus,
strigis repandis albis, basi apiceque glaucis.

— *Spec. Inf.* p. 270. no. 169. Ph. *Farinalis*.

Sedens caudam erigit.

Mülleri Faun. Fridr. p. 54. no. 478. Pyr. *Farinalis*.

Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 132. no. 1530. Pyr. *Farinalis*.

N. L.

Cramer Pap. exot. IV. p. 112. t. 348. Fig. D. Pyr.

Farinalis *Linn.*

328. *Glaucinalis*, der Blauflügel.

Müller l. c. p. 732. no. 328. der Glattflügel.

Wien. Schmett. A. Langschnauzichte Zünsler, P.

Longipalpes. p. 120. no. 10. *Unbek. R. Gelblicher*

Zünsler mit zwey Querstrichen. P. *Glaucina-*

lis *Linn.*

Die Querstriche kaum sichtbar.

Fabric. S. E. p. 641. no. 113. *Phalaena glaucina-*

lis. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 270. no. 172. N. L.

Clerk Phal. t. 5. f. 4.

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 479. Pyr. *glaucinalis*.

Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 132. no. 1531. Pyr. *glaucina-*

lis. N. L.

329. *Barbalis*, der *Langbart*.

Müller l. c. p. 732. no. 329. der *Schenkelbart*.

Eüesl. Schweiz. Inf. p. 41. no. 809. *Ph. barbalis*.
Selten.

Pontopp. N. G. v. D. p. 221. t. 17.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 9. *Kleezünsler*raupe
(*Trifolii pratensis*); *Kleezünsler*. *Pyr. barbalis*
Linn.

Raj. Hist. Inf. p. 227. no. 103. *Phalaena* parva, alis
latis, e fulvo utrinque albicantibus, nulla colo-
rum diversitate.

Scop. Ent. carn. p. 239. no. 605. *Pyr. barbalis*.

Alae omnes utrinque cinerascens; atomis
strigisque tribus. Antennae subpectinatae. Fe-
mora antica barbata.

Circa *Labacum*.

Long. lin. $6\frac{3}{4}$.

Fabric. S. E. p. 641. no. 114. *Phalaena barba-*
lis. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 271. no. 171. N. L.

Clerk Phal. t. 5. f. 3.

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 476. *Pyr. barbalis*.
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1532. N. L.

330. *Tentacularis*, der *Langfühler*.

Müller l. c. p. 732. no. 330. der *Langfühler*.

Wien. Schmett. p. 119. A. no. 2. *Butterblumzüns-*
*ler*raupe (*Leontodontis Taraxaci*); *Butterblum-*
zünsler.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 150. no. 32.

Fabric. S. E. p. 641. no. 115. *Phalaena tentacu-*
laris. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* p. 271. no. 172. N. L.

Degeer Inf. I. t. 5. f. 1.

— *Uebersf.* I. 1 Qu. p. 50. t. 5. f. 1.

— II. Part. I. p. 358. no. 12.

Phalène à antennes barbues, à trompe; à ailes horizontales d'un blanc sale avec deux lignes transverses d'un brun pâle, dont les barbillons de la tête égalent les antennes en longueur.

Phalène à très longs barbillons.

— *Uebersf.* II Th. I B. p. 260. no. 12. der *Langbart.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 54. no. 475. *Pyr. tentacularis.* Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1533. *Pyr. tentacularis.* N. L.

331. *Proboscidalis*, der *Rüsselfühler.*

Müller l. c. p. 732. no. 331. der *Rüsselfühler.*

Friesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 810. *Phal. proboscidalis.* Nicht selten.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 26. no. 59.

Kleemanns Beytr. p. 265. t. 32. f. 1. 10.

Die grün hellgestreifte mit zarten Härchen und 14 Füßen besetzte springende *Spannraupe* der 3ten Klasse.

Ueber den gewölbten Netzförmigen Augen noch ein kleines rundes.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. VI. *Feuervöglein.*

Ph. *Pyr. Proboscidalis.* t. 23. f. 6. 7. 8.

Das Weibchen blasfer.

Wien. Schmett. p. 119. A. no. 1. *Unbek. R. Brauner*

Züinsler mit spitzigem Außenwinkel der Oberflügel. *Pyr. Proboscidalis* L. *)

D 4

Scop.

*) Da hier die Raupe als unbekannt angegeben wird; so scheinen die W. Entomologen die *Kleemannische* wohl nicht für die *Probosc. L.* zu halten.

Scop. Ent. carn. p. 239. no. 606. Ph. Pyr. Proboscidalis.

Alae anticae supra cinereae, fasciis tribus fuscis; margine utrinque ferrugineo; postica in alae apice desinente; antennae subpectinatae.

In *Carniolia* non rara.

Lang. lin. 6.

Fabric. S. E. p. 642. no. 116. Phal. Proboscidalis. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. p. 271. no. 173. N. L.*

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 477. Ph. Pyr. Proboscidalis. N. L.

— *Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1534. Ph. Pyr. Proboscidalis. N. L.*

332. *Rostralis*, die *Langschnauze*.

Müller l. c. p. 733. no. 332. t. 22. f. 15. die Langschnauze.

Frieslins Schweiz. Inf. p. 42. no. 811. Ph. Rostralis.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 580. no. 1. Ph. Pyralis, die Haynbüchenmotte; die dunkelgraue langschnäblichte Lichtmotte; auf Weißbüchen und Hopfen.

Wien. Schmett. H. p. 119. no. 3. Hopfenzünsler. raupe (Humuli Lupuli); Hopfenzünsler. Ph. Pyr. Rostralis L.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 463. no. 21. Hopfenzünsler.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 14. t. 6. das grüne Springgräuplein auf dem Hopfen.

Raj. Hist. Inf. p. 214. no. 9.

Phalaena media e rufo cinerascens aut pulla, gemina proboscide sursum reflexa, alis exterioribus duplici transversa areola e rufo nigricante distinctis.

Geoffr.

Geoffr. Inf. II. p. 168. no. 116.

Phalaena feticornis spirilinguis, corniculis magnis cristatis, alis fusco-fumosis, medietate postica albidiore, punctis verrucosis eminentibus.

Le toupet à pointes.

Long. 6 lign.

Fabric. S. E. p. 642. no. 117. Phal. Rostralis. Nom. Linn.

Larva nuda, 14-poda, viridis; strigis obliquis lineisque lateralibus albis.

Pupa folliculata, brunnea, obtusa, antice carinata.

— *Spec. Insect. p. 271. no. 174. Nom. Linn.*

333 *Sulphuralis, der Schwefelflügel.*

Müller l. c. p. 733. no. 233. der Schwefelflügel.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 812. Phal. Sulphuralis. Bey uns selten.

Wien. Schmett. p. 93. Z. Halbspannraupen (Larvae Semigeometrae); reiche Eulen, Ph. Noctuae Metallicae: no. 6. Windeneulenraupe (Convoluti arvensis); Windeneule. N. Sulphurea (Pyralis Sulphuralis L.).

Beschäftigungen der Gesellsch. Naturf. Freunde zu Berlin. III. B. p. 37. t. 1. f. 7. Phal. Sulphuralis.

Schaeff. Icon. t. 9. f. 14. 15.

Fabric. Mantiss. p. 280. no. 83-84. Phal. Bombyx lugubris.

Alis deflexis flavis, rivulis punctisque atris; posticis fuscis.

— *Spec. Insect. p. 197. no. 116. Ph. B. lugubris.*

334. *Forficalis, das Kohlvögelchen.*

Müller l. c. p. 733. no. 334. der Kohlwurm.

*Füessl. Schweiz. Inf. p. 82. no. 813. Phal. Forfic-
alis.*

*Wien. Schmett. p. 122. B. Kurzschauzigte Zünsler :
no. 17. Meerrettigzünsler-raupe (Cochleariae Ar-
moraciae); Meerrettigzünsler. Ph. Forficalis
L.*

Schaeff. Icon. t. 51. f. 8. 9.

Geoffr. Inf. II. p. 166. no. III.

*Phalaena feticornis spirilinguis, triangularis;
alis deflexis flavis, lineis duabus ferrugineis obli-
quis.*

La bande esquissée.

Long. 6 lign.

*Syst. Natur. du Regn. Anim. II. p. 158. no. 70. Pha-
léne du Chou.*

Aët. Upsal. 1736. p. 24. no. 49.

Papilio alis planis pallidis nitidis.

Fabric. S. E. p. 642. no. 120. Nom. Linn.

*— Spec. Inf. p. 272. no. 177. Nom. L. Phalaena
Forficalis.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 54. no. 484. Ph. P. Forfica-
lis. N. L.*

*— Z. D. Pr. p. 133. no. 1535. Ph. P. Forficalis. N.
L.*

335. *Verticalis*, das Nesselvögelchen.

Müller l. c. p. 733. no. 335. der Nesselwurm.

Füessl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 814. Ph. Verticalis.

*Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 9. t. 4. der groß-
se grüne Blattwickler der größern Brennnessel.*

*Wien. Schmett. p. 120. B. no. 1. Nesselzünsler-rau-
pe (Urticae dioicae); Nesselzünsler. P. Vertica-
lis L.*

*Sulzers Kennz. der Inf. t. 16. f. 98. Ph. Purpura-
lis.*

Bekmann

Bekmann Ep. S. L. p. 167. no. 335. P. *Verticalis*.
System. Natur. du Regne Anim. II. p. 153. no. 46.
Phalène de l'ortie.

Act. Upsal. 1736. p. 24. no. 50.

Papilio alis planis nitidis albidis, fasciis undulatis.

Fabric. S. E. p. 643. no. 121. Phal. *Verticalis*. *)

— *Spec. Insect.* p. 272. no. 180. Phal. *Verticalis*. **)

Larva 16-poda, pilosa, capite pedibusque flavis.

Pupa brunnea, segmentis tribus ultimis denticulo notatis.

Raj. Inf. p. 207. no. 48.

Phalaena parva ex albido sublutea, alis exterioribus duplici linea transversa nigricante, oblique ducta notatis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 54. no. 482. Pyr. *Verticalis*. N. L.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 133. no. 1536. P. *Verticalis*. N. L.

336. *Pinguinalis*, das *Fettvögelchen*. ***)

Müller l. c. p. 733. no. 336. der *Butterkeeter*.

Füesl.

*) Hierbey hat *Fabricius* des *Geoffroy* Inf. II. p. 166. no. 12. *La bande à l'envers*, angeführt; dieses ist aber der *Wiener* Pyr. *Palealis*. p. 123. no. 27.

**) Hier stehet auch noch der *Geoffroy* p. 166. no. 12.

***) Von der Raupe sagt *Linné*: habitat — rarius in *Ventriculo humano*, inter *Vermes pessima*. Es ist möglich, daß dergleichen Räupchen mit den Speisen in den Magen kommen, und alleley üble Zufälle erregen können; man verwechsle sie aber ja nicht mit den eigentlichen *Eingeweide- und Darmwürmern*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 815. Ph. pinguinalis.

Abhandl. der schwed. Akad. der Wiss. 17 B. 1755. p. 50. Rolanders Beschr. einer glatten Raupe mit 16 Füßen und getheilten Gelenken, welche von allerley Hausmannskost lebt. t. 2.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 13. Schmalzzünsler-raupe (Butyri aliorumque pinguium); Schmalzzünsler. P. Pinguinalis L.

Schaeff. Icon. t. 60. f. 8. 9.

Réaum. Inf. III. t. 20. f. 5.

Fabric. S. E. p. 643. no. 124. Phal. pinguinalis. N. L.

— *Spec. Inf. p. 273. no. 184. Ph. pinguinalis. N. L.*

Larva 16-poda, laevis, fusca, nitida.

Pupa nuda, brunnea, obscura.

Pontopp. N. G. v. D. p. 221. no. 64. Ph. pinguinalis.

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 479. Pyr. Pinguinalis. N. L.

— *Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1537. Pyr. Pinguinalis. N. L.*

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 371. t. 6. f. 11.

Phalène à antennes filiformes sans trompe, à barbillons allongés; à ailes horizontales d'un gris d'agate avec des rayes & des taches brunes & noires.

Phalène de la graisse.

— *Uebers. II Th. I B. p. 271. t. 6. f. 11. die Fettphaläne.*

337. *Frumentalis*, das Getreidevögelchen.

Müller l. c. p. 734. no. 337. der Getreidewurm.

Pallas

*Pallas Reisen I. Th. p. 81. *)*

Neueste Entdeckungen im Russ. Reiche. I. p. 217.

338. *Secalis*, das *Rockenvögelchen*. **)

Müller l. c. p. 734. no. 338. der Rockenwurm.

Lepechins Reise durch Russl. I. p. 81. Sie sollen von gekochtem Wermuthwasser sterben.

Schwed. Abh. 1752. 14t. B. p. 67. Rolander von der Raupe in den weissen Aehren.

Wiener Schmett. p. 78. M. Seitestreifenraupen; schwarzgezeichnete Eulen: no. 17. Rockenhalm-eulenraupe (Secalis cerealis intra culmos habitans); Rockenhalmeule. Noctua Secalis L.

Fabric. S. E. p. 644. no. 125. Phal. Secalis. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. p. 273. no. 186. Phal. Secalis. Nom. L.*

An *Mülleri Faun. Fr. p. 46. no. 410? Ph. Noctua Secalis*, spirilinguis cristata cinerea: thorace bipunctato, alis strigis maculisque tribus; subtus punctatis.

In Spica *Secalis*.

— *Z. D. Pr. p. 124. no. 1425. Ph. N. Secalis.*

339. *Sanguinalis*, das *Blutband*.

Müller l. c. p. 734. no. 339. das Blutband.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 41. Unbek. R. Gelber Zünsler mit 2 rothen Querbinden. Pyr. Sanguinalis L. et p. 152.

Schaeff. Icon. t. 19. f. 16.

Fabric.

*) Die Larven fressen oft in Russland die Aecker rein ab. Das beste Mittel dagegen, die Felder, sobald die Saat aufgegangen, besonders bey feuchter Witterung, mit Asche von Buchweizen und Erbsenstroh bestreuet,

**) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 644. no. 126. Phal. Sanguinalis.
Nom. L.

— *Spec. Inf. p. 274. no. 188. Ph. Sanguinalis. N.*
L.

340. *Sticticalis*, der *Bartrand.* *)

Müller l. c. p. 734. no. 340. der Bartrand.

Fabric. S. E. p. 644. no. 127. Phal. Sticticalis.
Nom. L.

— *Spec. Inf. p. 274. no. 189. Phal. Sticticalis.*
N. L.

In Europa boreali.

341. *Reticularis*, der *Scheckrand.* **)

Müller l. c. p. 734. no. 341. der Buntbart.

Faun. Suec. ed. 2. p. 352. no. 1355. Ph. Pyr. Reticu-
laris.

342. *Purpuralis*, der *Purpurmantel.* ***)

Müller l. c. p. 735. no. 342. der Purpurmantel.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 42. Weisddornzünsler-
raupe (Crataegi oxyac.); Weisddornzünsler. Pyr.
Purpuralis L.

Fabric. S. E. p. 644. no. 131. Phal. purpuralis. Nom.
Linn.

— *Spec. Inf. p. 275. no. 194. Phal. purpuralis.*
N. L.

Variat rarius alis fuscis flavo-maculatis.

Mülleri Faun. Fr. p. 54. no. 483. Ph. Pyr. purpura-
lis. N. L.

— *Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1538. Ph. Pyr. purpu-*
ralis. N. L.

343 *Du-*

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

343. *Duplaris*, der Doppelpunkt. *)

Müller l. c. p. 735. no. 343. der *Parallelpunkt*.

Mülleri Z. D. Pr. p. 133. no. 1539. Pyr. *Duplaris*.
N. L.

— *Faun. Fridr.* p. 55. no. 485. Phal. *Tinea duplaris*. N. L.

Unabgebildete Linnéische Lichtmücken.

1. no. 338. *Secalis*.
2. no. 340. *Sticticalis*.
3. no. 341. *Reticularis*.
4. no. 342. *Purpuralis*.
5. no. 343. *Duplaris*.

Neue Arten von Lichtmücken.

1. *Nemoralis*, die Waldlichtmücke.

Fabric. S. E. p. 642. no. 118.

Palpis recurvatis, alis griseis; strigis tribus fuscis; intermedia flexuosa.

In Angliae Nemoribus.

— *Spec. Inf.* p. 271. no. 175.

Harris Inf. Angl. t. 6. f. 2?

2. *Palpalis*, die geradschnauzige Lichtmücke.

Fabric. S. E. p. 642. no. 119.

Palpis porrectis, thorace longioribus, alis griseis; posticis margine crassiori albo.

Habitat in Anglia.

— *Spec. Inf.* p. 271. no. 176.

3. *Fuscalis*, das Weissauge.

Fabric. S. E. p. 643. no. 122.

Palpis

*) Nicht abgebildet.

64 *Lepidoptera. 233. Phalaena Pyralis.*

Palpis recurvatis, alis fuscis, nitidis; anticis puncto subocellari niveo. In *India orientali*.
Fabric. Spec. Inf. p. 273. no. 182.

4. *Dorsalis*, die *braune Rückenlinie*.

Fabric. S. E. p. 643. no. 123.

Palpis recurvatis; alis cinereis, linea dorsali fasciisque postica fuscis. In *Brasilis*.
— *Spec. Inf. p. 273. no. 183.*

5. *Fascialis*, die *Doppelbinde*.

Fabric. S. E. p. 644. no. 128.

Palpis recurvatis, alis fuscis, fasciis duabus flavis.

In *Nova Hollandia*.

— *Spec. Inf. p. 274. no. 190.*

6. *Recurvalis*, die *Weissbinde*.

Fabric. S. E. p. 644. no. 129.

Palpis recurvatis, alis fuscis; anticis fasciis duabus albis; posteriore abbreviata.

In *India orientali*.

— *Spec. Inf. p. 274. no. 192.*

7. *Punctalis*, der *Weissrand*.

Fabric. S. E. p. 644. no. 130.

Alis subferrugineis, striga flava, margine crafiori albo-punctato.

— *Spec. Inf. p. 275. no. 193.*

In *Europae borealis Nemoribus*.

8. *Costalis*, der *Rippenfleck*.

Fabric. S. E. p. 644. no. 132.

Alis purpurascentibus; maculis duabus costalibus, margineque postico flavis. In *Anglia*.

Fabric.

Fabric. Spec. Inf. p. 275. no. 196.

9. *Dentalis*, die *Purpurbinde*.

Fabric. S. E. p. 645. no. 134.

Alis flavis; fascia purpurea.

In *India orientali*.

— *Spec. Inf. p. 275. no. 198.*

10. *Undalis*, die *Wasserbinde*. *)

Fabric. Spec. Insect. p. 272. no. 178.

Alis obscure cinereis, strigis tribus obliquis undatis niveis.

In *Italia*.

11. *Ferrugalis*, die *Rostbinde*.

Fabric. Spec. Inf. p. 273. no. 185.

Alis flavis, strigis tribus undatis ferrugineis.

In *Africa aequinoctiali*.

12. *Nivealis*, der *Schneebauch*.

Fabric. Spec. Inf. p. 274. no. 187.

Alis griseo-fuscis, maculis duabus costalibus albis, corpore niveo.

In *Germania*.

13. *Strigalis*, die *Purpurader*.

Fabric. Spec. Inf. p. 274. no. 191.

Alis griseis, strigis duabus flavis costaque purpurascente.

In *Germaniae Nemoribus*.

14. *Ver-*

*) Die *Noctuum Sagittam*, S. E. p. 597. no. 3. hält *Fabric.* nun selbst in seinen *Spec. Inf. p. 272. no. 179.* für eine *Phalaenam* oder *Pyralidem* L. Palpis recurvis, alis cinereis, macula costali atra, posticis flavis, margine fusco: *Phalaena Sagittalis*.

Caput acuminatum.

14. *Verrucalis*, die Dreywarze.

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 484.

Palpis porrectis, alis albis, lineis duabus nigris acutis; *verrucis tribus*.

In *Pariete*.

— Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1540. Ph. Pyr. *Verrucalis*.

15. *Anthracinalis*, der Köhler.

Scop. Ent. carn. p. 239. no. 607.

Tota nigra; alis anticis albo-maculatis. Antennae mari pectinatae.

Circa *torrentes*. Long. lin. $6\frac{1}{2}$.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 46. Schwarzer Zünsler mit viel weißen Fleckchen. P. *Anthracinalis*

Scop. Die Raupe ist entdeckt. S. Nachtrag p. 317.

16. *Citrinalis*, die Zitrongelbe Lichtmücke.

Scop. Ent. carn. p. 240. no. 609.

Alae citrinae; posticae pallidiores immaculae; anticae fascia submarginali et cratere sanguineo reticulatae.

Circa *Idriam*.

Palpi lin. $1\frac{1}{2}$ longi.

Long. lin. 4.

17. *Trabealis*, der schwarze Balken.

Scop. Ent. carn. p. 240. no. 610.

Alae anticae paleaceae; fasciis binis; *trabe* longitudinali maculisque (5) nigris.

Labaco mortuam accepi.

Long. lin. $4\frac{1}{2}$.

18. *Cristalis*, der schwarze Busch.

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 611.

Alae fuscae; anticae supra ferrugineo fusco-
que nebulosae; *crista* nigricante in medio no-
tatae.

Circa *Idriam*.

Long. lin. $3\frac{1}{2}$.

19. *Lunalis*, das braune Mündgen.

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 612.

Alae cervinae; anticae strigis tribus obsoletis
lunulaque fuscis.

Labaci degit.

Long. lin. $6\frac{1}{2}$.

20. *Viminalis*, die Bindweiden-Lichtmücke.

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 613.

Alae murinae, fascia obscuriore utrinque.

In aut circa *Salicem viminalem*.

Long. lin. 5.

21. *Extimalis*, die Rostspitze.

Scop. Ent. carn. p. 241. no. 614.

Alba; alis anticis apice ferrugineis.

In agro *Labacensi*.

Long. lin. 5.

22. *Sericealis*, der Seidenglanz.

Scop. Ent. carn. p. 642. no. 615.

Tota subossea, sed *Serici* in modum nitens;
alis anticis macula obsoleta fuscescente.

In agro *Labacensi*.

Long. lin. 4.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 18. Unbek. R. Hell-
okergelber Zünsler mit einem schwarzen Mond-
fleckchen. P. *Sericealis* Scop.

23. *Ruralis*, der Landmann.

Scop. Ent. carn. p. 242. no. 616.

Alae paleaceae, strigis transversis, undulatis, obsoletis, fuscis.

Ruri degit.

Long. lin. 7.

24. *Trivialis*, der gemeine Mann.

Scop. Ent. carn. p. 642. no. 617.

Alae paleaceae; anticae supra fascia lineis tribus obscurioribus composita, ab alae margine inferiore nata et in apicem desinente.

Vulgaris apud nos in hortis et pratis.

Long. lin. 6.

25. *Nemoralis*, die Waldnymph.

Scop. Ent. carn. p. 642. no. 618.

Alae anticae basi osseae, venulis paleaceis reticulatae, limbo paleaceo, parte intermedia vinaceae, margine externo repando.

In *Nemoribus* frigidis umbrosis.

Long. lin. 5.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 34. Unbek. R. Gelb- und düsterröthlicher Zünsler mit weiß- und braun-gezähntem Saume. P. Nemoralis Scop.

26. *Majalis*, die Maylichtmücke.

Scop. Ent. carn. p. 643. no. 619.

Alae anticae supra albae; fasciis tribus, interruptis, fuscescentibus. Pectus pedesque argentei, tibiis fusco-annulatis.

In pratis *Majo M.*

Long. lin. 4.

27. *Luteolaris*, die Leimfarbige Lichtmücke. *)

Scop.

*) *Ib. no. 136. Phal. priori simillima, sed absque palpis porrectis, et linea longitudinali, marginali fusco-lutea evidentiore.*

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 118. no. 135.

Pallide lutea, palpis thorace longioribus, ascendentibus.

In *Hungariae* pratis montanis.

Long. lin. 5-6.

28. *Tinealis*, einwärts bleicher, auswärts düstrier Zünsler.

Wien. Schmett. p. 119. A. no. 4. Unbek. R.

29. *Decimalis*, mit einem weißlichten X bezeichneter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 119. A. no. 5. Unbek. R.

30. *Bombycalis*, gelbbrauner Zünsler mit gelbgerandetem Querbande.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 6. Unbek. R.

31. *Angustalis*, braunrother Zünsler mit schmalen Oberflügeln.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 7. Unbek. R.

32. *Curtalis*, blaßoraniengelber Zünsler mit rothbraunen Querstrichen.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 8. Unbek. R.

33. *Grisealis*, Lichtgrauer Zünsler mit drey Querstrichen.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 11. Unbek. R.

34. *Emortualis*, grünlichgrauer Zünsler mit 2 gelben Querstrichen.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 12. Unbek. R.

35. *Dentalis*, Olivengrünlicher zackicht gezeichneter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 120. A. no. 14. Unbek. R.

36. *Repandalis*, glänzender weißlich- und graugewäsfarter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 120. B. no. 2. Unbek. R.

37. *Triquetralis*, glänzendweißlicher Zünsler mit 2 Wellenstrichen und einem Dreyeck.

Wien. Schmett. p. 120. B. no. 3. Unbek. R.

38. *Politalis*, Strohgelber und Kupferbrauner Zünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 4. Unbek. R.

39. *Verbascalis*, der Wollkrautzünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 5. Wollkrautzünsler-raupe (Verbasci Thapsi).

40. *Lancealis*, glänzendgrauer Zünsler mit Lanzenförmigen Oberflügeln.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 6. Unbek. R.

41. *Flavalis*, glänzender hellgelber Zünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 7. Unbek. R.

42. *Fuscalis*, glänzender graubräunlicher Zünsler mit blassen Wellenstrichen.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 8. Unbek. R.

43. *Polygonalis*, Wegetrittzünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 9. Wegetrittzünsler-raupe (Polygoni avicularis).

44. *Elutalis*, glänzendweißer blaßbraun gerandeter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 121. B. no. 10. Unbek. R.

45. *Prunalis*, Schlehenzünsler.

Wien.

*Wien. Schmett. p. 121. B. no. 11. Schlehenzünsler-
raupe (Pruni spinosae).*

46. *Sambucalis*, der *Holderzünsler*.

*Wien. Schmett. p. 122. B. no. 14. Holderzünsler-
raupe (Sambuci nigrae).*

47. *Literalis*, brauner Zünsler mit weissen Zügen.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 15. Unbek. R.

48. *Salicalis*, der *Weidenzünsler*.

*Wien. Schmett. p. 122. B. no. 16. t. I. b. f. 5. Wei-
denzünsler-raupe (Salicis Triandrae etc.). t. I. a.
f. 5.*

49. *Lunatralis*, graulichter Zünsler mit einem schwar-
zen Mondfleckchen.

Wien. Schmett. p. 122. B. no. 19. Unbek. R.

50. *Olivalis*, glänzender Olivenbräunlicher Zünsler
mit weissen Mittelzeichen.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 21. Unbek. R.

51. *Corticalis*, hellbrauner, weiss und schwarz gestrich-
ter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 22. Unbek. R.

52. *Alpinalis*, glänzender grauer Zünsler mit weisser
Mittelmakel.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 24. Unbek. R.

53. *Punctalis*, Quittengelblicher Zünsler mit einem
weissen Punkt.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 25. Unbek. R.

54. *Aenealis*, bräunlichtgrauer, Kupferschielender
Zünsler.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 26. Unbek. R.

55. *Palealis*, blafsgrünlichtgelber Zünsler.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 27. Unbek. R.

Geoffr. Inf. II. p. 166. no. 112.

Phalaena seticornis spirilinguis triangularis,
alis deflexis albo-virescentibus, subtus lineis
duabus transversis nigris.

La bande à l'envers.

Long. 7 lign.

56. *Ochrealis*, hellokergelber Zünsler.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 28. Unbek. R.

57. *Margaritalis*, glänzender Perlfarbiger Zünsler.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 29. Unbek. R.

58. *Cespitalis*, gelb, braun und grauneblicher Zünsler
 mit gelblichen Querstrichen der Unterflügel.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 32. Unbek. R.

59. *Flammealis*, gelber Zünsler mit Fleischfarbichtem
 Rande.

Wien. Schmett. p. 123. B. no. 35. Unbek. R.

60. *Rubidalis*, Purpurbrauner Zünsler mit 2 gelben
 Querstrichen.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 36. Unbek. R.

61. *Regalis*, glänzender braunrother Zünsler mit 2
 silbernen halben Querbinden.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 37. Unbek. R.

62. *Fimbrialis*, Purpurfarbiger Zünsler mit goldgel-
 bem Untenrande.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 38. Unbek. R.

63. *Au-*

63. *Auroralis*, gelber Zünsler mit Purpurstreifen.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 39. Unbek. R.

64. *Pudoralis*, der Zünsler mit weißen rosenroth gefleckten Oberflügeln.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 40. Unbek. R.

65. *Quadripunctalis*, Purpurschwarzer Zünsler mit vier gelben Fleckchen.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 43. Unbek. R.

Geoffr. Inf. II. p. 195. no. 33.

Tinea fusco-rubra, alis superioribus maculis duabus croceis transversim positis.

La Teigne à deux taches jaunes en bande.

Long. 3 lign.

66. *Pollinalis*, schwarzer, weißgefleckter und bestäubter Zünsler.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 44. Unbek. R.

67. *Guttalis*, schwarzer Zünsler mit 8 weißen Fleckchen.

Wien. Schmett. p. 124. B. no. 45. Unbek. R.

68. *Nivalis*, schimmernd weißer bräunlicht gewässerter Zünsler. *)

Wien. Schmett. Nachtr. p. 316. A. no. 46. Unbek. R.

69. *Trinalis*, hochgelber dreymaklichter Zünsler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 47. Unbek. R.

*) Die *Pyr. Calvarialis*, schwarzbrauner Zünsler mit gelbem schwarzgezeichnetem Mittelflecke, ist schon vorher ihre *N. Calvaria*; wie auch p. 317. *P. Marginalis* ihre *N. Marginea*.

74 *Lepidoptera*. 233. *Phalaena Pyralis*.

70. *Punicealis*, rother gelbgefleckter Zünsler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 49. Unbek.
R.

71. *Porphyralis*, schwärzlichrother gelbgestrich- und
punktirter Zünsler.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 317. B. no. 50. Unbek.
R.

72. *Aufonia*, die Surinamische *Aufonia*.

Cramer Pap. exot. II. p. 66. t. 140. Fig. C.

Alis incarnatis, ciliatis; anticarum dextra li-
neola curva atra.

73. *Flegia*, die Surinamische *Flegia*.

Cramer Pap. exot. II. p. 66. t. 140. Fig. D.

Alis concoloribus niveo-perlaceis; anticarum
margine exteriori pallide glaucis.

74. *Chorebus*, der Surinamische *Chorebus*.

Cramer Pap. exot. II. p. 25. t. 113. Fig. D.

Alis anticis falcatis fuscis, lineis transversis
incarnatis; posticis obscurioribus.

75. *Diaphana*, der afrikanische *Durchschein*.

Cramer Pap. exot. II. p. 26. t. 113. Fig. G.

Alis niveis, atro-punctatis, lineisque transver-
sis luteis.

76. *Politia*, die afrikanische *Politia*.

Cramer Pap. exot. II. p. 35. t. 120. Fig. A.

Alis niveis, rubro-micantibus; anticis margi-
ne anteriore luteo.

77. *Nitocris*, die Surinamische *Nitokris*.

Cramer Pap. exot. III. p. 148. t. 275. Fig. A.

Alis

Alis olivaceis concoloribus; anticis margine anteriore rubro-punctatis, lineaque longitudinali communi atro-liturata; posticis lunulis olivaceis marginalibus.

78. *Pueritia*, die *Koromandelsche Pueritia*.

Cramer Pap. exot. III. p. 128. t. 164. Fig. E.

Alis fuscis; anticis apice et margine exteriori; posticis pariter maculis nigris, glauco-punctatis.

79. *Tedea*, die — *Tedea*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 48. t. 312. Fig. G.

Alis anticis testaceis, posticis incarnatis; omnibus maculis argentaceis.

80. *Sulphuralis*, der *Schwefelflügel*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. E.

Tota sulphurea; alis anticis, binis lineis transversis, punctisque argenteis.

81. *Bilineata*, die *Doppellinie*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 138. t. 360. Fig. I.

Alis anticis, pulchre rubris, singula flavo-bilineata.

82. *Margaritaria*, das *goldne V*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 150. t. 367. Fig. K.

Alis violaceis, litteris V aurantiacis.

Clerk Icon. t. 51. f. 3. 4.

83. *Procopia*, die *Surinamische Prokopia*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 152. t. 368. Fig. E.

Alis violaceis, albo-striatis, basi aurantiacanis.

84. *Marginalis*, der *Surinamische Olivenrand*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 160. t. 371. Fig. D.

Triangularis; alis albescentibus nigro-striatis, margine lato-olivaceo.

Merian. Surin. t. 41. f. 2.

85. *Venustalis*, die *Surinamische Venustalis*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 162. t. 371. Fig. I.

Alis anticis flavescentibus, nigro-serpentulatis; posticis aurantiacis.

86. *Reginalis*, die *Surinamische Schwarzbinde*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 163. t. 372. Fig. C.

Alis incarnatis, anticis aterrimae fasciatis.

87. *Vicinalis*, die *Surinamische Schecke*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. G.

Flavo-rubro-furvoque variegata.

88. *Floralis*, das *Surinamische Blümchen*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 191. t. 384. Fig. G.

Hilare rutilans, binis anticarum fasciis albis.

89. *Houttuinialis*, die *Houttuinische Lichtmücke*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 192. t. 384. Fig. L.

Nigra, aurantiaco-maculata.

VI. *Motten*, Phal. *Tineae*. *)

344. *Gelatella*, die *Kerbelmotte*. **)

Mül-

*) Es ist merkwürdig, daß bey dem Mottengeschlecht die *Weibchen einiger Arten Flügellos sind*. Ich nenne dies Geschlecht *Motten*, um es von den *Schaben*, *Blattis*, zu unterscheiden. Zu diesen *Motten* gehören die *Minirer*, *Vers mineurs*; *Larvae Subcutaneae*.

**) Da *Linné* selbst dieser Motte den Geschlechtsnamen *Tinea* beyge-

Müllers Erkl. des Linn. Naturfyst. Vten Th. Iter B. p. 735. no. 344. der *Apfelschäler*. *)

Martini allgem. Gesch. der Nat. in alphab. Ordn. III B. p. 129. *Apfelschäler*.

Wien. Schmett. p. 144. D. *Schnauzenlose Schaben*, Ph. *Tineae Impalpes*, mit gespitzten Oberflügeln: no. 38. *Rothweidenschabenraupe* (*Salicis purpureae*); *Rothweidenschabe*. Ph. T. *Gelatella* L. Fem. *Hemiptera*.

Clerk Phal. t. 8. f. 3.

345. *Sociella*, die gesellschaftliche Honigmotte.

Müller l. c. p. 735. no. 345. die *Honigmotte*.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 345. T. *Gelatella*.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 95. Le plus grand de tous ceux nommés: *nasutae* par *Linnaeus*.

Fabric. S. E. p. 656. no. 3. *Tinea Sociella*.

Alis oblongis, cinereis, antice albidis, postice pallidis, striga undata, nigra.

— *Spec. Inf.* p. 289. no. 3. T. *Sociella*.

Clerk Phal. t. 3. f. II.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 466.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe; à ailes roulées d'un blanc cendré avec des atomes bruns, & deux rayes obliques brunes.

Phaléne à ailes à rouleau applati.

Degeer

beygesetzt hat; so habe ich sie von den *Blattwicklern* abgesondert, und zu den *Tineis* gesetzt.

*) Die Uebersetzung in dem Müllerschen Kommentar ist sonderbar: „dieses Insekt pflegt sich gerne bey den vom Tische getragenen *Aepfelschaalen* einzufinden.“

Linn. Habitat in *Pomariis sub mense defoliationis*. In den *Obstkammern*, um die Zeit, oder in dem Monat, wenn die *Blätter* fallen.

Degeer Ueberf. II Th. I B. p. 343. no. 4. die *Phaläne* mit flachgerollten Flügeln.

346. *Colonella*, die *Kolonmotte*.

Müller l. c. p. 736. no. 346. das *Kolon*.

Wiener Schmett. p. 133. B. Geradschnauzigte Schaben, Ph. T. *Directipalpes*, mit stumpfen Oberflügeln: no. 1. *Unbek. Raupe*; röthlichgraue Schabe mit schwarzem Mittelpunkte. T. *Colonella* L. Groß, und gleicht einer *Eule* (*Noctua*).

Neuer Schaupl. der Natur II. p. 193. Ph. *Colonella*. *Fabric.* S. E. p. 655. no. 2. T. *Colonella*. Nom. *Linn.*

Puncta duo atra ad marginem crassiores.

— *Spec. Inf.* II. p. 289. no. 2. T. *Colonella*.

Clerk Phal. t. 3. f. 8.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 163. no. 102. *Phalène des Jardins*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1541. Ph. T. *Colonella*. Nom. L.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 467. no. 5.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à ailes roulées d'un gris d'agate avec deux rayes ondées noirâtres, & un point noir au milieu.

Phalène agathe à ailes roulées à point noir.

— *Ueberf.* II Th. I B. p. 342. no. 5. die *Achatfarbige Phaläne* mit zusammengerollten Flügeln und schwarzem Punkt.

347. *Pusiella*, die *Zahnlinie*.

Müller l. c. p. 736. no. 347. der *Zahnstrich*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 816. Ph. *pusiella*. Bey Zürich selten.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 9. der *Zahnstrich*.

Fabric.

Fabric. S. E. p. 656. no. 6. T. *Pusiella*. Nom. *Linn.*
In *Germaniae arvis*.

— *Nov. Spec. Inf.* p. 291. no. 8. T. *Pusiella*.

348. *Bella*, das *punktirte Band*.

Müller l. c. p. 736. no. 348. das *Punktband*.

Raj. Hist. Inf. p. 211. no. 1.

Phalaena minor fulva, maculis nigris, alba
linea pulchre aspersis.

Linn. Mus. L. V. p. 399. no. 34.

Fabric. S. E. p. 585. no. 101. Ph. *Bombyx* bella.
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 203. no. 141. Ph. B. *bella*.

Drury Illustr. of nat. hist. I. t. 24. f. 3.

Cramer Pap. exot. P. I. t. 109. Fig. CD.

349. *Pulchella*, der *Blutpunkt*.

Müller l. c. p. 736. no. 349. der *Blutpunkt*.

Lepechins Reise durch Rußl. P. I. p. 302.

Glabachs neue Schmett. t. 15. f. 5. 6. der *Blut-*
punkt.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 11. der
Blutpunkt.

Wien. Schmett. p. 67. C. *Spindelraupen*, Larvae
Fusiformes; *Schabenartige Eulen*, Ph. Noctuae
Tineiformes: no. 9. *Sonnenwendeeulenraupe*
(*Heliotropii europ.* etc.); *Sonnenwendeeule*; No-
ctua *Pulchra*. *Tinea Pulchella* L.

Schaeff. Icon. t. 122. f. 1.

Fabric. S. E. p. 586. no. 102. Ph. *Bombyx* pulchel-
la. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 203. no. 142. Ph. B. *pulchella*.

Cramer Pap. exot. P. I. p. 108. t. 109. Fig. EF. Ph.
Lotrix.

Scop. Ent. carn. p. 208. no. 514. Phal. *pulchella*.

Alba;

Alba; alis anticis nigro-rubroque punctatis;
posticis limbo fusco.

In flore *Scabiosae arvensis*.

Long. lin. $7\frac{1}{3}$. Lat. $3\frac{1}{3}$.

350. *Evonymella*, die *Spillbaumotte*. *)

Müller l. c. p. 736. no. 350. die *Spillbaumotte*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 817. Ph. *Evonymella*.

— Magaz. der Entomol. II B. p. 39. Ph. *Evonymella* — die Raupen derselben haben viele *Zwirnwürmer*.

Röfels Insektenbel. I B. NV. 4te Kl. p. 19. t. 8. die gelbe gefellige *Heckenschabe*.

Maders (Kleemanns) Raupenkalender p. 61. no. 171. die *Spillbaumotte*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 395. no. 1. Ph. T. *Evonymella*, die *Spindelstrauchmotte*.

Die Oberflügel weiß mit 50 schwarzen Punkten, und unten braun.

Glafer von schädlichen Raupen (neue Ausg.) p. 44. *Raupe des punktirten Nachtschmetterlings*, Ph. *Evonymella*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 23. *Spindelbaumotte*.

Wien. Schmett. p. 138. C. *Krummschnauzichte Schaben*, Ph. T. *Recurvipalpes*: no. 18. *Spindelbaumschabenraupe* (*Evonymi Europaei*); *Spindelbaumschabe*, T. *Evonymella* L.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 350. Ph. T. *Evonymella*.

Onomat. hist. nat. VI. p. 358. die *Spillbaumotte*.

Catholicon E. p. 311. *Evonymella*.

System.

*) Das Linnéische Zitatum: *Frisch* V. t. 16. gehört nicht hieher, sondern zu der folgenden, *Padella*.

System. Nat. du Regn. Anim. II. p. 159. no. 81.

Phalène de Chenille, qui vit en commun sur le Poirier, le Cerisier, & autres arbres, & qui en ravage toutes les feuilles.

Réaumur Inf. II. t. 12. f. 12. 13. I. t. 17. f. 10. II.

La Chenille du *Fusain*; le *petit deuil*.

Raj. Hist. Inf. p. 196. Phalaena parva, alis longis, lividis seu plumbeis, exterioribus punctis nigris, inferioribus fuscis.

Act. Upsal. 1736. p. 26. no. 81. Papilio alis depressis argenteis, nigro-punctatis.

Scop. Entom. carn. p. 241. no. 631. Ph. T. Evonymella.

Alae anticae supra albae, punctis nigris ad (27).

Long. lin. 5 $\frac{1}{4}$.

Fabric. S. E. p. 656. no. 4. Ph. T. Evonymella. Nom. Linn.

Larva gregaria, nuda, flava, nigro-punctata, sub tentorio communi.

Pupa folliculata, brunnea.

— *Spec. Inf. II. p. 290. no. 6. T. Evonymella.*

Geoffr. Inf. p. 183. no. 4. Tinea alis superioribus, albis punctis nigris, inferioribus fuscis.

La *Teigne blanche à points noirs*.

Long. 4 $\frac{1}{2}$ lign.

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 487. Ph. T. Evonymella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Prodr. p. 133. no. 1542. Ph. T. Evonymella.*

351. *Padella, die Obstmotte.*

Müller l. c. p. 737. no. 351. die Obstmotte.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 818. T. Padella.

Füesl. Magazin der Entomol. 2 B. p. 39. Ph. T. *Padella*.

Frisch Inf. V. p. 38. no. 16. 2 Pl. t. 16. von den geselligen Blattmotten und ihren Papilions.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 17. t. 7. die graue gesellige Heckenfchabe, oder Schabenraupe, mit dem großen Gewebe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 33. *Vogelkirschenschabenraupe* (*Padi Pruni*); *Vogelkirschenschabe*. T. *Padella* L.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 789. no. 19. P. T. *Padella*, *Patscherbenmotte*.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 351. Tin. *Padella*.

Scop. Ent. carn. p. 247. no. 636. Ph. T. *Padella*.

Similis *Evonymellae*, sed diversa, 1) punctis paucioribus, nec ultra (20), 2) alis anticis minus albis, subtus ubique fuscis; 3) alis posticis utrinque fuscis totis.

Long. lin. $4\frac{1}{2}$.

Fabric. S. E. p. 656. no. 5. Tin. *Padella*. Nom. *Linn.*

Larva gregaria, nuda, grisea; segmentis utrinque puncto atro, sub tentorio communi.

Pupa folliculata, flavicans.

— *Spec.* Inf. II. p. 290. no. 7. Tin. *Padella*.

Schaeff. Icon. t. 145. f. 2. 3.

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 488. Tin. *Padella*. Nom. *Linn.*

— *Zool.* Dan. Pr. p. 133. no. 1543. Tin. *Padella*.

Degeer Inf. II. p. 479. no. 1. t. 10. f. 14. 15. 16.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes pendantes, d'un gris-de-perle cendré à vingt points noirs.

Phalène petit-deuil cendré à 20 points noirs.

Chenilles rases couleur d'ardoise, dont les deux extrémités du corps sont jaunes, avec deux rangs de taches noires & à seize pattes: fig. 10.
— Ueberf. II Th. I B. p. 354. no. 1. t. 10. f. 10. 14. 15. 16.

Die kleine aschfarbige Trauerphaläne mit zwanzig schwarzen Punkten.

352. *Sequella*, die Krummlinie.

Müller l. c. p. 737. no. 352. der Krummbalken.
Wien. Schmett. p. 140. C. no. 55. Steinsamenschabenraupe (*Lithospermi purpurei coerulei*); Steinsamenschabe. T. *Sequella* L.
Fabric. S. E. p. 657. no. 7. T. *Sequella*. N. Linn.
— Spec. Inf. II. p. 291. no. 9. Tin. *Sequella*.
Clerk Phal. t. 10. f. 14.

353. *Crataegella*, Hagedornmotte. *)

Müller l. c. p. 737. no. 353. die Hagedornmotte.
Wien. Schmett. p. 142. D. no. 7. Hagedornschabenraupe (*Crataegi Oxyacanthae*); Hagedornschabe. T. *Crataegella* L.

354. *Irrorella*, der Dreypunkt.

Müller l. c. p. 737. no. 354. die Pomeranzenmotte.
Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 819. Tin. *Irrorella*.
Wien. Schmett. p. 68. C. Spindelraupen, Larvae *Fusiformes*; Schabenartige Eulen, Ph. Noct. *Tineiformes*: no. 6. Baumflechteneulenraupe (*Lichenis olivacei* etc.); Baumflechteneule. N. *Irrorea* (Tin. *Irrorella* L.).
Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 10. die Pomeranzenmotte.

F 2

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 657. no. 9. Tin. Irrorella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 291. no. 11. Tin. Irrorella.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1606. b. Tin. Irrorella. Nom. Linn.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 342. t. 5. f. 12.

Phalène à antennes barbues, à trompe; à ailes rabatues arrondies d'un jaune d'ocre clair, picquées de points noirs, dont le corps est noir & le bout du ventre jaune.

Phalène jaune à points noirs.

— *Uebersf. II Th. I B. p. 248. t. 5. f. 12. die gelbe schwarzpunktirte Motte.*

355. *Lutarella*, die Leimfarbige Motte.

Müller l. c. p. 737. no. 355. die Gelblingin.

Wien. Schmett. p. 68. C. no. 3. Steinflechteneulen-raupe (Lichenis saxatilis); Steinflechteneule. Noct. Luteola (Tin. Lutarella L.)

Clerk Phal. t. 4. f. 9.

Fabric. S. E. p. 657. no. 10. Tin. Lutarella.

Alis supra luteis, immaculatis, subtus fuscis.

— *Spec. Inf. II. p. 291. no. 13. Tin. Lutarella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 486. Tin. Lutarella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1559. Tin. Lutarella.*

356. *Mesomella*, die Grasmotte.

Müller l. c. p. 738. no. 356. Grasmotte.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 820. Ph. Mesomella.

Clerk Phal. t. 4. f. 14.

Fabric. S. E. p. 657. no. 11. Tin. Mesomella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 292. no. 14.*

Alis

Alis anticis pallidis, margine flavo, punctisque duobus fuscis.

357. *Oxyacanthella*, die *Weißdornmotte*. *)

Müller l. c. p. 738. no. 357. *Weißdornmotte*.

Fabric. S. E. p. 657. no. 12. Tin. *Oxyacanthella*.
Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 292. no. 15. Tin. *Oxyacanthella*.

358. *Pinetella*, die *Fichtenmotte*.

Müller l. c. p. 738. no. 358. *Fichtenmotte*.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 7. *Föhrenschabenraupe* (*Pini sylvestris*); *Föhrenschabe*. Tin. *Pinetella* L.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 503. no. 8. Ph. Tin. *Pinetella*, die *gelbe Fichtenmotte*.

Knochs Beytr. I. p. 69. t. 4. f. 7. Ph. Tin. *Pinetella*, die *Fichtenmotte*.

Alis anticis pallide aurantiis; alba pyramide longitudinali fasciis binis colore alae interrupta.

Scop. Entom. carn. p. 244. no. 622. Ph. *Pinetella*.

Alae anticae ut in *Pascuella*; sed alba pyramide longitudinali, fasciis binis colore alae interrupta.

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 657. no. 13. Tin. *Pinetella*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 292. no. 16. Tin. *Pinetella*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 133. no. 1544. Tin. *Pinetella*. Nom. L.

359. *Pascuella*, die *Futterkrautmotte*. **)

Müller l. c. p. 738. no. 359. die *Futtermotte*.

F 3

Wien:

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 4. Unbek. R. Bleichgelbe Schabe mit einer geraden Silberstreife.

Scop. Ent. carn. p. 244. no. 621. Ph. *Pascuella*.

Alae anticae pallide aurantiae; linea alba longitudinali, a basi fere ad limbum usque producta, utrinque acuminata, inferiore latere dente in medio instructa; linea limbi transversa, aliaque marginali argenteis; area his interjecta cinerea; apice introrsum plicata.

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 658. no. 15. Tin. *Pascuella*.

Alis cinereis, linea albissima, margine postico, nigro-punctato.

— Spec. Inf. II. p. 292. no. 18. Tin. *Pascuella*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1545. Tin. *Pascuella*. Nom. Linn.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 465. no. 2.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes roulées d'un blanc jaunâtre avec des lignes longitudinales argentées, à barbillons allongés.

Phalène à ailes roulées blancheâtres, à lignes argentées.

— Uebers. II Th. I B. p. 342. no. 2. die *Phaläne* mit weislichen zusammengerollten Flügeln mit Silberfarbigen Linien.

360. *Pratella*, die *Wiesenmotte*.

Müller l. c. p. 738. no. 360. die *Wiesenmotte*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 24. no. 821. Ph. *Pratella*.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 29. Unbekannte Raupe; graue mit Silber geradgestrichte Schabe.

Clerk Phal. t. 3. f. 14. (male).

Syst. Natur. du Regn. Anim. II. p. 163. no. 98.

Fabric. S. E. p. 658. no. 14. *Tinea Pratella*. Nom. Linn.

Fabric.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 292. no. 17. Tin. *Pratella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 491. Tin. *Pratella.*

Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1546. Tin. *Pratella.*

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 464. no. 1.

Phaléne à antennes filiformes, à trompe, à ailes roulées d'un blanc argentés en dessus & d'un brun griseâtre en dessous.

Phaléne argentée à ailes roulées.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 341. no. 1. die *Silberphaläne mit zusammengerollten Flügeln.*

361. *Culmella*, die *Halmenmotte.*

Müller l. c. p. 739. no. 361. *Halmenmotte.*

Friesl. schweiz. Inf. p. 42. no. 822. Phal. *Culmella.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 9. *Wurzelschabenraupe* (*Radicum graminis*); *Wurzelschabe.* T. *Culmella* L.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 97.

Schaeff. Icon. t. 145. f. 1. 2.

Raj. Hist. Inf. p. 229. no. 106.

Phalaena minor pascuorum gemina proboscide, alis oblongis, cum sedet, circumvolutis, exterioribus ex argenteo lutescentibus vel argenteis vel plumbeis.

Act. Upsal. 1736. p. 26. no. 82. Papilio alis depressis cuneiformibus oblongis striatis.

Scop. Entom. carn. p. 246. no. 630. Phal. *Culmella.*

Albida tota et immaculata; alis posticis fimbria argentea; oculis nigris.

Long. lin. $4\frac{1}{3}$.

Fabric. S. E. p. 658. no. 16. T. *Culmella.*

Alis cinereis; linea unica albissima, abbreviata.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 233. no. 19. Tin. Cul-
mella.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1549. Tin. Cul-
mella. Nom. Linn.

362. *Rorella*, die *Thaumotte*. *)

Müller l. c. p. 739. no. 362. Thaumotte.

363. *Carnella*, der *Blutrand*.

Müller l. c. p. 739. no. 363. Fleischrolle.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 823. Tin. Carnella.

— *Magaz. der Entomol. II B. p. 107.*

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 13. Unbekannte Rau-
pe; rosenrothe und gelbe Schabe.

Naturforsch. III St. p. 7. t. I. f. 6. die Rosenrothe
Binde, Fascia Rosea. (D. Kühn.)

Sulzers Gesch. der Inf. p. 162. t. 23. f. 12. die Fleisch-
rolle.

Schaeff. Icon. t. 247. f. 2. 3.

Fabric. S. E. p. 658. no. 18. Tin. Carnella. Nom.
Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 293. no. 21. Tin. Carnella.*

364. *Nemorella*, die *Waldmotte*. **)

Müller l. c. p. 739. no. 264. Waldmotte.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 939. no. 3. die weißliche
Waldmotte mit gekrümmten Flügeln, wovon die
obern am innern Rande einen schwarzen Punkt
haben.

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 492. Tin. Nemorel-
la. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1547. Tin. Nemo-*
rella.

365. Un-

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

365. *Unguicella*, der Nagelflügel.*Müller* l. c. p. 739. no. 365. *Nagelflügel*.*Clerk* Phal. t. 12. f. 7.*Syst. Nat. du Regn. Anim.* II. p. 159. no. 80.*Fabric.* S. E. p. 654. no. 51. *Pyralis unguicana*.Nom. *Linn.*— *Spec. Inf.* II. p. 287. no. 70. *Pyralis unguicana*.366. *Ramella*, die Eichenmotte. *)*Müller* l. c. p. 740. no. 366. *Eichenmotte*.*Gleditsch* Forstwiss. I. p. 657. no. 46. *Tinea Ramella*, die kleine weißgraue Sprossenschabe.367. *Salicella*, die Weidenmotte.*Müller* l. c. p. 740. no. 367. t. 22. f. 16. *Weidenmotte*.*Füesl.* schweiz. Inf. p. 42. no. 824. Tin. *Salicella*.*Röfels* Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 20. t. 9. der auf Weidenbäumen wohnende schwarze und mit weißen Punkten besetzte Blattwickler.*Maders* (Kleem.) Raupenkal. p. 39. no. 102. p. 62. no. 172. Tin. *Salicella*, *Weidenmotte*.*Gleditsch* Forstwiss. II. p. 785. no. 83. Tin. *Salicella*, die kleine blaugraue weißpunktirte Weidenmotte.*Wien.* Schmett. p. 131. E. no. 37. *Bandweidenwickler* (raupe (*Salicis viminalis*); *Bandweidenwickler*. Tortr. *Salicana*.*Sulzers* Kennz. t. 16. f. 97.*Fabric.* S. E. p. 659. no. 21. Tin. *Salicella*. Nom. *Linn.**Larva* nuda, 16-poda, fusca, albo-punctata.*Pupa* antice nigra, postice brunnea.

F 5

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 294. no. 27. Tin. Salicella.

368. *Cynosbatella*, die *Rosenmotte*.

Müller l. c. p. 740. no. 368. Rosenmotte.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 825. Tin. Cynosbatella.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 1033. no. 5. Tin. Cynosbatella, die graue Knospenmotte der Heckrosen mit weißen Flügelspitzen und einem schwarzen Punkt.

Fabric. S. E. p. 654. no. 54. Pyralis Cynosbana. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 287. no. 74. Pyr. Cynosbana.*

Mülleri Faun. Fr. p. 56. no. 494. Tin. Cynosbatella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1548. Tin. Cynosbatella.*

Degeer Inf. I. t. 34. f. 4. 5.

— *Uebersf. I. 3 Quart. p. 76.*

— *Tom. II. Part. I. p. 486. no. 5.*

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes pendantes d'un brun noirâtre par devant & blanches par derriere avec des taches brunes, à corcelet non-huppé.

Phalène brune par devant & blanche par derriere à taches brunes.

— *Uebersf. II Th. I B. p. 359. no. 5. die braungefleckte, vorn braune und hinten weiße Phaläne.*

369. *Foenella*, die *Heumotte*.

Müller l. c. p. 740. no. 369. Heumotte.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 826. Tin. Foenella.

Clerk Phal. t. 2. f. 13.

Fabric.

Fabric. S. E. p. 659. no. 22. Tin. Foenella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 294. no. 29. Tin. Foenella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 517. Tin. Foenella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1550. Tin. Foenella.*

370. *Vestianella*, die *Tuchmotte*. *)

Müller l. c. p. 740. no. 370. Tuchmotte.

Fischers Naturgesch. von Livland p. 154. no. 373. Tuchmotte.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 669. Ph. Vestianella.

Alae cinerascens; costa alba.

Long. lin. 3½.

Fabric. S. E. p. 660. no. 25. Tin. Vestianella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 295. no. 32. Tin. Vestianella.*

371. *Tapetzella*, die *Tapetenmotte*.

Müller l. c. p. 741. no. 371. Tapetenmotte.

Fischers N. G. von Livland p. 155. no. 374. Tapetenmotte.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 13. Tapetenschabens-raupe (Tapetium etc.); Tapetenschabe. T. Tapetzella L.

Raj. Hist. Inf. p. 204. no. 98. Tinea vestivora major, alis oblongis acutis; exterioribus ad scapulas nigricantibus, inferius albentibus, interioribus fuscis sive cinereis.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 82.

Clerk Phal. t. II. f. 12.

Geoffr. Inf. II. p. 187. no. 13.

Tinea nigra, capite niveo, alis pone albidis.

La Teigne bedaupe à tête blanche.

Long.

*) Nicht abgebildet.

Long. 4½ lign.

Fabric. S. E. p. 659. no. 23. Tin. *Tapetzella*.

Alis nigris, postice albis, capite niveo.

— *Spec. Inf.* II. p. 295. no. 30. Tin. *Tapetzella*. *)

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 503. Tin. *Tapetzella*. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 134. no. 1552. Tin. *Tapetzella*.

372. *Pellionella*, die *Pelzmotte*. **)

Müller l. c. p. 741. no. 372. *Pelzmotte*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 827. Tin. *Pellionella*.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 46. t. 17. die dem *Pelzwerk* sehr schädliche *Schabenraupe*.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 119. no. 336. Tin. *Pellionella*.

Neuer Schaupl. der Nat. I B. p. 144. VI. p. 406. *Pelzmotte*.

Olaffens Reise durch Island I. p. 320. *Pelzmotte*.

Allgem. Magaz. der Nat. X. p. 365. *Pelzmotte*.

Fischers N. G. von Livland p. 155. no. 375. die *Pelzmotte*.

Eberts Naturl. für die Jug. III. p. 95.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 24. *Pelzmotte*.

Der *Dronth.* Gesellsch. Schr. IV. p. 286. no. 48. Tin. *Pellionella*.

Onomat.

*) Die vom Fabricius hierbey angeführte zwote Untergattung des *Geoffroy* no. 14. la Teigne bedaupe à tête brune, ist *Linn. Ph. Tortr. Fasciana* no. 283. (*Wien. Schmett.* p. 131. no. 36.)

**) *Conf. Scop. Tin. Zoolegella*: Ent. carn. no. 666. forte eadem, sed *Tinea* haec *Scop.* non est *causa*. v. unter den *neuen* no. 196.

Onomat. hist. nat. VI. p. 395. *Pelzschabe.*

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 84. Teigne, qui ronge les habits à poils.

Geoffr. Inf. II. p. 184. no. 6.

Tinea plumbea nitida, puncto nigro in medio alarum.

La *Teigne commune.*

Long. 2 lign.

Fabric. S. E. p. 659. no. 24. Tin. *Pellionella.* Nom. *Linn.*

Larva albicans, linea dorsali rubra, intra cucullum latitans.

Pupa flavescens.

— *Spec. Inf.* II. p. 295. no. 31. Tin. *Pellionella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 504. Tin. *Pellionella.* Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 134. no. 1553. Tin. *Pellionella.*

373. *Sarcitella*, die Kleidermotte.

Müller l. c. p. 741. no. 373. *Kleidermotte.*

Füesl. schweiz. Inf. p. 42. no. 828. Tin. *Sarcitella.*
In den Kleiderschränken.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 41. t. 15. die den Insektensammlungen höchst schädliche Schabenraupe.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 143. *Tuchaftermot-ten.*

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 119. no. 336. Tin. *Sarcitella.* *)

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 41. *Kleiderschabenraupe*

*) Hier wird die auf t. 17. im Röfel abgebildete Motte für *Pellionella* und *Sarcitella* angegeben, da doch t. 15. eigentlich die *Sarcitella* ist.

pe (Vestimentorum); *Kleiderschabe*. Tin. *Sarcitella* L.

Fischers N. G. von Livland p. 155. no. 376. *Kleidermotte*.

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 25. *Kleidermotte*.

Berlin. Samml. VII. p. 613. Mittel gegen die *Kleidermotten*.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 160. no. 83.

Fabric. S. E. p. 660. no. 26. Tin. *Sarcitella*. Nom. *Linn.*

Parva; tota cinerea, nitida.

— *Spec. Inf.* II. p. 295. no. 33. Tin. *Sarcitella*.

374. *Nisella*, der *Eyerfleck*.

Müller l. c. p. 741. no. 374. *Eyerfleck*.

Scop. Ent. carn. p. 247. no. 634. Tin. *Nisella*.

Alae anticae canescentes; macula communis ovata nigricante.

In *Sylvis*.

Long. lin. $4\frac{3}{4}$.

Clerk Phal. t. 12. f. 6.

375. *Mellonella*, der *Honiglecker*.*)

Müller l. c. p. 741. no. 375. *Honiglecker*.

Friesl. schweiz. Inf. p. 42. no. 829. Tin. *Mellonella*. In den *Bienenkörben* und im *Wachstuch*.

Röfels Insektenbel. III. p. 242. t. 41. die zu der NV. 4ter Kl. gehörige *Bienenschabe*.

Swammerd. Bib. der Nat. Fol. p. 208. t. 26. f. 2. der *Wolf* in den *Bienenkörben*.

Neuer

*) Diese Art Motten nennet *Colamella* Lib. 3. cap. 14. Vermiculos ac Tineas. *Virgil.* Georg. 4. Dirum Tineae genus. *Plin.* H. N. Lib. XI. c. 19. Papilionem ignavum.

Destruuntur fumo fini mixti cum medula bovina.

Neuer Schaupl. der Nat. I B. p. 142. *Aftermotte*; *Bienenmotte*; *Bienenschabe*; *Bienenfalter*; *Faufse-teigne de la cire*; *Wolf*.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 2. *Honigschabenraupe* (Mellis in Alvearibus); *Honigschabe*. T. *Mellonella* L.

Bonnets Betr. über die Natur p. 457 *Aftermotten*.

Eberts Naturl. für die Jug. III. p. 95.

Abhandl. der schwed. Ges. der Wiss. 24 B. p. 24.

Unterf. und Beschr. einer der Bienenzucht höchst schädlichen Raupe und des daraus entstehenden Schmetterlings, von Adolph *Modeer*. t. 1. f. 1-12.

Tin. *Mellonella* L.

Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 372. no. 19.

Tin. *Mellonella*.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 375. Tin. *Mellonella*.

Scop. Ann. 4. hist. nat. p. 40. obs. 15. *Tinea Mellonella*.

Fabric. S. E. p. 660. no. 28. Tin. *Mellonella*. Nom. *Linn.*

Larva nuda, 16-poda, grisea, capite brunneo.

Pupa folliculata, brunnea.

— *Spec. Inf.* II. p. 296. no. 36. Tin. *Mellonella*.

376. *Cucullatella*, die *Sperbermotte*.

Müller l. c. p. 742. no. 376. *Sperbermotte*.

Füesl. schweiz. Inf. p. 42. no. 830. Tin. *Cucullatella*. Auf *Birn- und Apfelblättern*.

— *Magaz. der Entomol.* II. p. 39. Tin. *Cucullatella*.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 24. t. II. das kleine, braune, haarige Apfelbaumräuplein mit weissen Schildern.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 848. no. 3. *Tinea Cucullatella*, die *weisse Vogelbeerbaummotte*.

Onomat. Hist. nat. VI. p. 346. die *Sperbermotte*.

Fabric. S. E. p. 660. no. 29. *Tin. Cucullatella*.

Alis argenteis; *arcu dorsali* fusco.

Larva pilosa, 14-poda, fusca; dorso albo maculato.

Pupa folliculata, obtusa, fusca.

— *Spec. Inf.* II. p. 296. no. 37. *Tin. Cucullatella*

377. *Granella*, die *Kornmotte*. *)

Müller l. c. p. 742. no. 377. *Kornwurm*.

Friesl. schweiz. *Inf.* p. 42. no. 831. *Tin. Granella*.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 25. t. 12. der schädliche, wohlbekannte, *weisse Kornwurm*.

Maders (Kleem.) *Raupenkal.* p. 78. no. 223. p. 89. no. 257. *Tin. Granella*, der *Kornwurm*.

Bakers zum Gebrauch leicht gemachtes *Microscopium* p. 236. t. XI. f. 13. A B. *Wolf* im Korn.

Bonnets Betr. über die Natur p. 458. *Aftermotten* auf den Kornböden.

Berlin. Samml. IV. p. 341. *Kornwurm* no. 1.

Martini *Naturlex.* I. 634. *Getreideaftermotten*; der *Wolf*; der *weisse Kornwurm*. *Tin. Granella*.

Abhandl. der königl. schwed. *Ges. der Wiss.* VIII. p. 49. t. I. f. 1-4. *Raupe*. *Beschr.* kleiner *weisser Raupen*, welche das Korn auf Böden und Vorrathsbehältnissen verzehren. (Carl *Degeer*.)

Oekonomische Nachr. der patriotischen *Ges.* in *Schlesien* I. p. 159. *Kornmotte*.

— II. p. 119. *Kornmotte*.

Neuer

*) Ich nenne sie lieber *Kornmotte*, um sie von dem *Kornwurm*, *Curculio granarius* et *scumentarius*, zu unterscheiden.

Neuer Schaupl. der Nat. I. p. 144. Kornmotten.

Eberts Naturl. für die Jugend III. p. 95.

Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 372. no. 20. Tin.

Granella, Wolf; weißer Kornwurm.

Wien. Schmett. p. 144. C. no. 77. Kornschabenraupe (Frumenti in Granariis); Kornschabe. Tin. Granella L.

Loevenhoek Opp. Tom. II. Arcana Nat. detecta p. 241-252. f. 2. A A. Lupus.

Tiburtius von den Kornmotten. Berlin. 12. 1665.

Behm. Epit. S. L. p. 168. no. 377. Tin. Granella, weißer Kornwurm; Wolf.

Bonar. Dict. des Anim. IV. 313. VIII. 245. Fauße-Teigne du Bled.

Fabric. S. E. p. 668. no. 8. Alucita granella. Nom. Linn.

Larva 16-poda, nuda, alba, capite brunneo.

Pupa folliculata, attenuata, brunnea.

— *Spec. Inf. II. p. 307. no. 10. Alucita granella.*

Geoffr. Inf. II. p. 186. no. 11.

Tinea tota fusco-nebulosa, capite albido.

La Teigne brune à tête blancheâtre.

Long. 3 $\frac{2}{3}$ lign.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1556. Tin. granella. Nom. Linn.

378. *Lappella*, die Klettenmotte.

Müller l. c. p. 742. no. 378. Klettenmotte.

Abhandl. der königl. schwed. Ges. der Wiss. XIV. p. 72. der Klettenschmetterling (von Renström).

Phalaena feticornis, spirilinguis, alis incumbentibus; superioribus cinereo-griseis, puncto atro; inferioribus atris, omnibus margine postico interiore, barbatis.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 12. *Klettenschaben-
raupe* (Arctii Lappae); *Klettenschabe*. Tin. *Lapp-
pella* L.

Clerk Phal. t. II. f. 15.

Fabric. S. E. p. 668. no. 9. *Alucita Lappella*
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 308. no. 12. *Aluc. Lappella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 510. Tin. *Lappella*.
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 134. no. 1555. Tin. *Lappella*.

379. *Proletella*, die *Muttermotte*. *)

Müller l. c. p. 742. no. 379. *Muttermotte*.

Füesl. schweiz. Inf. p. 42. no. 832. Tin. *Proletella*.
Auf der Unterseite des Kohls.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 17. *Mutter-
motte*.

380. *Arbutella*, *Bärentraubenmotte*. **)

Müller l. c. p. 742. no. 380. *Bärentraubenmotte*.

Cathol. A. p. 446. *Arbutella*, *Sandbeerenmotte*.

Fabric. S. E. p. 661. no. 30. Tin. *Arbutella*.

Alis rufis, strigis argenteis, intermediis bifidis.

— *Spec. Inf. II.* p. 296. no. 39. Tin. *Arbutella*.

Mülleri Faun. Fr. p. 56. no. 496. Tin. *Arbutella*.
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 134. no. 1557. Tin. *Arbu-
tella*.

381. *Tessella*, die *Würfelmotte*. ***)

Müller l. c. p. 742. no. 381. *Würfelmotte*.

Füesl.

*) Parit quotannis 200000 soboles, dum 12 progenies ponant 12
ova singula.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 833. Tin. *Tessella*.
Gleditsch Forstwiss. II. p. 978. no. 25. Tin. *Tessella*.

Die schwarzgeflügelte Motte mit zwey weissen weit aus einander stehenden gewürfelten Binden.

Franz von Paula *Schrank* Beytr. zur Naturgesch. p. 81. *Würfelmotte*. Tin. *Tessella*.

Der *Dronth.* Gesellsch. Schr. IV. p. 287. no. 49. Tin. *Tessella*.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 87.

Fabric. S. E. p. 661. no. 31. Tin. *Tessella*. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 296. no. 40. T. *Tessella*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1560. Tin. *Tessella*.

382. *Vittella*, die Schwarzbinde.

Müller l. c. p. 743. no. 382. Schwarzlinie.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 42. Ubekannte Raupe; Aschgraue Schabe mit schwarzem Innenrande. T. *Vittella* L.

Clerk Phal. t. 15. f. 10.

Fabric. S. E. p. 668. no. 6. *Alucita Vittella*.

Alis cinereis; vitta dorsali margineque postico nigris.

— *Spec. Inf.* II. p. 307. no. 7. *Aluc. vittella*.

In *Lipfiae* hortis.

Mülleri Faun. Fridr. p. 55. no. 489. Tin. *vittella*.
 Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1554. Tin. *vittella*.

383. *Uftella*, der Brandrand.

Müller l. c. p. 743. no. 383. Brandrand.

Clerk Phal. t. 3. f. 13.

384. *Parenthesella*, die *Weisslinie*. *)

Müller l. c. p. 743. no. 384. *Weisslinie*.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 834. Tin. *Parenthesella*. Auf den *Viehweiden*.

Fabric. S. E. p. 661. no. 33. Tin. *Parenthesella*.
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 297. no. 43. Tin. *Parenthesella*.

385. *Elongella*, der *Schmalflügel*. **)

Müller l. c. p. 743. no. 385. *Schmalflügel*.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 67. *Unbek. Raupe*;
Beinfarbige Schabe. Tin. *Elongella* L.

Fabric. Mantiss. p. 295. no. 33-34. Tin. *Elongella*.
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 297. no. 44. Tin. *Elongella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 514. Tin. *Elongella*.
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 135. no. 1564. Tin. *Elongella*.

386. *Punctella*, der *Punktflügel*. ***)

Müller l. c. p. 743. no. 386. *Punktflügel*.

Fabric. S. E. p. 661. no. 34. Tin. *Punctella*. Nom.
Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 297. no. 46. Tin. *Punctella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 515. Tin. *Punctella*.
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 135. no. 1565. Tin. *Punctella*.

387. *Bicostella*, die *Doppelrippe*.

Müller l. c. p. 743. no. 387. *Doppelrippe*.

Clerk Phal. t. 3. f. 15.

Scop.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Scop. Entom. carn. p. 249. no. 642. Phal. bico-
stella.

Caput, dorsum, alae anticae, alba; linea longitudinali ferruginea a basi ad apicem excurren-
te prope marginem crassiolem; disco punctis
subternis atris.

Circa *Idriam.*

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 661. no. 32. Tin. bicoftella.

Alis cinereis, linea longitudinali fusca, pal-
pis porrectis.

— *Spec. Inf. II. p. 297. no. 42. Tin. bicoftella.*

In *Europae* hortis.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1562. Tin. bico-
stella. Nom. Linn.

388. *Tetrapodella, Vierfuss. *)*

Müller l. c. p. 744. no. 388. Vierfuss. Auf den
Kirschbäumen.

389. *Xylostella, die Leukogenmotte.*

Müller l. c. p. 744. no. 389. Leukogenmotte.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 42. no. 835. Tin. Xylostella.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 22. t. 10. das
sehr kleine Kohl- und Salatrüuplein.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 103. no. 294. die
Leukojenmotte.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 54. Heckkirschenscha-
benraupe (Loniceri Xylostei); Heckkirschenscha-
be. Tin. Xylostella L.

Der Dronth. Gesellsch. Schr. IV. p. 287. no. 50. Tin.
Xylostella.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 939. no. 2. Phal. Tinea
Xylostella.

*) Nicht abgebildet.

Die aschgraue *Welpermeymotte* mit einem weissen zackichten Flecke.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 99.

Fabric. S. E. p. 667. no. 1. Alucita Xylostella.

Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 306. no. 1. Aluc. Xylostella.*

Geoffr. Inf. II. p. 195. no. 35.

Tinea cinerea, dorso vitta longitudinali alba.

La Teigne à bandelette blanche.

Long. 3 lign.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1562. Tin. Xylostella. Nom. Linn.

390. *Cinctella*, die *Pappelmotte*. *)

Müller l. c. p. 744. no. 390. Pappelmotte.

Füesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 836. Tin. Cinctella.

Der Dronth. Gesellsch. Schr. IV. p. 288. no. 53. Tin. Cinctella.

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 651. Phal. Vorticella.

Nigra, alis anticis fascia alba lineari.

In foliis fruticum.

Long. lin. 2 $\frac{3}{4}$.

Fabric. S. E. p. 662. no. 36. Tin. cinctella.

Alis nigris, anticis striga argentea.

— *Spec. Inf. II. p. 298. no. 48. Tin. cinctella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 495. Tin. cinctella.

Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 134. no. 1558. Tin. cinctella.*

391. *Leucatella*, das *Weissband*. **)

Müller l. c. p. 744. no. 391. Weissband.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 42. Unbekannte Raupe; schwärzliche Schabe mit weissem Bande und Punkten.

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 662. no. 37. Tin. Leucatella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 298. no. 49. Tin. Leucatella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 516. Tin. Leucatella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1566. Tin. Leucatella.*

392. *Cinerella*, der *Grauflügel*. *)

Müller l. c. p. 744. no. 392. Grauflügel.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 25. Unbek. R. Grauglänzende Schabe.

Fabric. S. E. p. 662. no. 40. Tin. Cinerella.

Alis fusco-cinereis, nitidulis, immaculatis.

— *Spec. Inf. II. p. 299. no. 55. Tin. Cinerella.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1563. Tin. Cinerella. Nom. Linn.

393. *Trigonella*, das *Doppeldreyeck*. **)

Müller l. c. p. 745. no. 393. Doppeldreyeck.

Der Dronth. Gesellsch. Schr. IV. p. 287. no. 81. Tin. Trigonella.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 978. no. 26. Tin. Trigonella, die braune Motte mit dem gedoppelten weissen dreyeckigen Fleck.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 163. no. 101.

Fabric. S. E. p. 663. no. 42. Tin. Trigonella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 299. no. 57. Tin. Trigonella.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1567. Tin. Trigonella. Nom. Linn.

394. *Rhomboidella*, das *schwarze Viereck*. ***)

Müller l. c. p. 745. no. 394. Schwarzwiereck.

G 4

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 663. no. 43. Tin. Rhomboïdella.
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 299. no. 58. Tin. Rhomboïdella.*

395. *Tertianella*, die *Dunkelstreife*. *)

Müller l. c. p. 745. no. 395. Dunkelstrich.

— *Faun. Fridr. p. 57. no. 511. Tin. Tertianella.*
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1568. Tin. Tertianella.*

396. *Scabrella*, der *Schuppenflügel*. **)

Müller l. c. p. 745. no. 396. Schuppenflügel.

Fabric. Mantill. p. 297. no. 10-11. Alucita Scabrella.

Alis fusco cinereis, punctis nigris elevatis scabris.

— *Spec. Inf. II. p. 308. no. 14. Aluc. Scabrella.*

397. *Asperella*, der *Schuppenfleck*. ***)

Müller l. c. p. 745. no. 397. Schuppenfleck.

Fließl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 837. Tin. Asperella.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 46. Unbekannte Raupe; grünweißlichte Schabe mit gefichelten Oberflügeln.

Catholicon A. p. 535. Asperella, die rauhe Motte.

398. *Serratella*, der *Langschenkel*. †)

Müller l. c. p. 745. no. 398. Langschenkel.

399. *Populella*, der *Haarflügel*. ††)

Müller

*) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

††) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

Müller l. c. p. 746. no. 399. *Haarflügel.*

400. *Mercurella*, die *Queckfilbermotte*. *)

Müller l. c. p. 746. no. 400. *Queckfilbermotte.*

401. *Pomonella*, die *Obstmotte.*

Müller l. c. p. 746. no. 401. *Birnmotte.*

Füesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 835. Tin. *Pomonella.*

Frisch Inf. VII. p. 16. no. 10. 2te Pl. t. 10. der *Obst-*
wurm in Birnen und Aepfeln.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 33. t. 13. die
kleine Apfel- und Birnraupe, oder der sogenann-
te *Apfel- und Birnenwurm.*

Maders (Kleem.) *Raupenkal.* p. 39. no. 104. p. 62.
no. 173. Tin. *Pomonella*, *Birnmotte.*

Gleditsch *Forstwiss.* II. p. 789. no. 18. Tin. *Pomo-*
nella, die *Birnraupe.*

Wien. *Schmett.* p. 126. B. no. 10. *Apfelwicklerrau-*
pe (*Pyri mali*); *Apfelwickler.* T. *Pomonana* (*Po-*
monella L.).

Onomat. hist. nat. VI. p. 399. die *Birnmotte.*

Bekm. Ep. S. L. p. 168. no. 401. Tin. *Pomonella.*

Fabric. S. E. p. 653. no. 49. *Pyrallis Pomana.*
Nom. *Linn.*

Larva 16-poda, nuda, rufa, capite nigro.

Pupa folliculata, brunnea.

— *Spec. Inf.* II. p. 286. no. 67. *Pyrallis Pomana.*

Mülleri *Faun. Fridr.* p. 57. no. 505. Tin. *Pomonel-*
la. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1576. Tin. *Pomo-*
nella.

402. *Strobilella*, die *Tannzapfenmotte.*

Müller l. c. p. 746. no. 402. *Zapfenmotte.*

*) Nicht abgebildet.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 839. Tin. *Strobilella*.
Gleditsch Forstwiss. I. p. 504. no. 9. Tin. *Strobilel-*
la, *Tannzapfenmotte*.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 24. *Tannzapfenschä-*
benraupe (*Strobilorum abietis*); *Tannzapfen-*
schabe. Tin. *Strobilella* L.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 164. no. 104.

Clerk Phal. t. 12. f. 10.

Fabric. S. E. p. 662. no. 38. Tin. *Strobilella*. Nom.
Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 298. no. 50. Tin. *Strobilella*.

Degeer Inf. Tom. II. P. I. p. 490. no. 9. t. 9. f. 15.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à
ailes pendantes d'un brun obscur avec des rayes
transverses couleur d'agate.

Petite Phalène des Pommes de Sapin.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 362. no. 9. t. 9. f. 15. die
kleine Tannapfelphaläne.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 506. Tin. *Strobilel-*
la. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1577. Tin. *Strobi-*
lella.

403. *Turionella*, die *Anflugmotte*.

Müller l. c. p. 746. no. 403. *Anflugmotte*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 504. no. 10. Tin. *Turio-*
nella, die *Lichtgraue Maywachsmotte*.

Degeer Uebers. I Th. 3 Quart. p. 74.

Clerk Phal. t. 12. f. 15.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 507. Tin. *Turionel-*
la. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 156. no. 1578. Tin. *Turio-*
nella.

404. *Dodecella*, der *Zwölfpunkt*.

Müller

Müller l. c. p. 747. no. 404. *Zwölfpunkt.*

Gleditsch Forstwiss. I. p. 504. no. II. Tin. *Dodecella*, die *Lichtgraue und braunstipplichte Maywachsmotte.*

Degeer Inf. I. t. 22. f. 22. 23. 24.

— *Ueberf.* 3 Quart. p. 73.

— Inf. Tom. II. Part. I. p. 494. no. 3.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites un peu élevées grises à quatre bandes ondées noirâtres & six huppées élevées noires.

Phalène teigne à douze huppées sur les ailes.

— *Ueberf.* II Th. I B p. 365. no. 3. die *Mottenphaläne mit zwölf Bürstgen auf den Flügeln.*

Fabric. Spec. Inf. II. p. 298. no. 53. Tin. *Dodecella*, grisea, nigro-punctata.

Larva 16-poda, laevis ferruginea.

Pupa folliculata, conica, ferruginea.

Imago palpis reflexis coniformibus.

Ledermüller Gemüths- und Augenergötzung p. 122. t. 64. der Saame von der rothen Tanne oder Fichte, und die denselben so schädliche kleine Raupe mit ihrer Verwandlung zur Schabe. *)

405. *Cembrella*, der *Weißsprenkel.* **)

Müller l. c. p. 747. no. 405. *Weißsprenkel.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 39. *Fichtenschabenraupe* (*Pini Sylvestris*); *Fichtenschabe.* Tin. *Cembrella* L.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 508. Tin. *Cembrella.* Nom. *Linn.*

— *Zool.* Dan. Pr. p. 156. no. 1579. Tin. *Cembrella.*

406. *Re-*

*) Da die kleine Motte hier t. 64. 1. punktirt abgebildet ist; so glaube ich, dafs es die *Dodecella* ist.

**) Nicht abgebildet.

406. *Resinella*, die *Harzmotte*.

Müller l. c. p. 747. no. 406. *Harzmotte*.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 840. Tin. *Resinella*.

Frisch Inf. X. p. 11. no. 9. 2te Pl. t. 9. die *Kien-*
sprossennotte.

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 44. t. 16. die in
den Harzbeulen des Kiehn- oder Föhrenbaums
wohnende *Sehabennraupe*.

Maders (Kleem.) Raupenkal. p. 117. no. 331. Tin.
Resinella, *Harzmotte*.

Bonnets und anderer Abhandl. aus der Insektol. p.
391.

Fr. von Paula *Schrank* Beytr. zur N. G. p. 42. *Kien-*
sprossennotte. *Fliege* aus derselben. t. 2. f. 5.

Fischers N. G. von Livl. p. 155. no. 377. *Kienspross-*
sennotte.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 406. Tin. *Resinella*.

Fabric. S. E. p. 654. no. 55. *Pyrallis Resinana*.
Nom. *Linn.*

— Spec. Inf. II. p. 288. no. 75. Tin. *Resinana*.

Larva 16-poda, nuda, lutea, capite brunneo.

Pupa folliculata, fusca.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 508. *Tinea Resinella*.
Nom. *Linn.*

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1580. Tin. *Resinella*.

Degeer Inf. I. t. 33. f. 12. 13.

— Ueberf. I. 3 Quart. p. 65.

— Tom. II. P. I. p. 491. no. 10.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à
ailes pendantes d'un gris cendré avec des rayes
transverses & des nuances noires.

Phalène des galles resineuses du Pin.

— Ueberf. II Th. I B. p. 363. no. 10. die *Fichten-*
harzphaläne.

407. *Taedella*, der Spaltfleck.

Müller l. c. p. 747. no. 407. Spaltfleck.
Clerk Phal. t. 10. f. 13.

408. *Iuniperella*, die Wacholdermotte. *)

Müller l. c. p. 747. no. 408. Wacholdermotte.
Wien. Schmett. p. 139. C. no. 26. Wacholderscha-
benraupe (*Iuniperi communis*); Wacholderscha-
be. Tin. *Iuniperella* L.
Cathol. I. p. 405. *Iuniperella*.

409. *Fuscella*, die Hausmotte. **)

Müller l. c. p. 748. no. 409. Hausmotte.
Fabric. S. E. p. 662. no. 39. Tin. *Fuscella*. Nom.
Linn.
— *Spec. Inf.* II. p. 299. no. 54. Tin. *Fuscella*.
Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1569. Tin. *Fuscel-*
la. Nom. *Linn.*

410. *Minutella*, die Miniaturmotte. ***)

Müller l. c. p. 748. no. 410. Mignaturmotte.
Wien. Schmett. p. 140. C. no. 30. Unbek. R. Ku-
pferbraune Schabe mit unterbrochenem gelben
Querbande.
Fabric. *Spec. Inf.* II. p. 300. no. 63. Alis atris, ma-
culis duabus ferrugineis suboppositis.
In Europae hortis.

411. *Corticella*, die Rindenmotte. †)

Müller l. c. p. 748. no. 411. Rindenmotte.
Gleditsch Forstwiss. I. p. 558. no. 14. Tin. *Corticel-*
la, die Rindenmotte.

412. *Sti-*

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

412. *Stipella*, der Schwefelfleck.

Müller l. c. p. 748. no. 412. Schwefelfleck.

Pontopp. N. G. von Dännem. p. 222. Tin. *Stipella*.
t. 17.

Clerk Phal. t. 12. f. 5.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1575. Tin. *Stipella*.
la. Nom. *Linn.*

413. *Sylvella*, die Rostbinde. *)

Müller l. c. p. 748. no. 413. das Bartköpfchen.

Fabric. S. E. p. 667. no. 3. *Alucita Sylvella*.
Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 306. no. 4. *Aluc. Sylvella*.

414. *Gemmella*, der Eichenblattminirer.

Müller l. c. p. 748. no. 414. Silberwolke.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 657. no. 47. Tin. *Gemmella*,
die kleine Eichenblattschabe.

Clerk Phal. t. 10. f. 10.

Fabric. S. E. p. 663. no. 44. Tin. *Gemmella*. Nom.
Linn.

— *Spec. Inf. II.* p. 299. no. 59. Tin. *Gemmella*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1570. Tin. *Gemmella*. Nom. *Linn.*

415. *Bractella*, der Goldflügel.

Müller l. c. p. 749. no. 415. Goldflügel.

Füesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 841. Tin. *Bractella*.

Clerk Phal. t. 12. f. 4.

Fabric. S. E. p. 662. no. 41. Tinea *Bractella*.

Alis nigris, macula baseos fasciaque media interrupta sulphureis.

— *Spec. Inf. II.* p. 299. no. 56. Tin. *Bractella*.

Mülleri

*) Nicht abgebildet.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1571. Tin. *Bractella*. Nom. Linn.

416. *Aristella*, die Silberlinie. *)

Müller l. c. p. 749. no. 416. Silberlinie.

Cathol. A. p. 477. *Aristella*.

Fabric. S. E. p. 669. no. 11. *Alucita Aristella*.
Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 308. no. 15. Aluc. *Aristella*.

417. *Caudella*, die Schwanzlinie. **)

Müller l. c. p. 749. no. 417. Schwanzlinie.

Fabric. S. E. p. 669. no. 12. *Alucita Caudella*.

Alis subcaudatis, testaceis; linea postica fusca.

— *Spec. Inf.* II. p. 308. no. 16. Aluc. *Caudella*.

418. *Capitella*, der Gelbkopf. ***)

Müller l. c. p. 749. no. 418. Gelbkopf.

Fabric. S. E. p. 663. no. 45. Tin. *Capitella*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 300. no. 60. Tin. *Capitella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 493. Tin. *Capitella*.
Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1581. Tin. *Capitella*.

419. *Porrectella*, der Hahnen Schwanz.

Müller l. c. p. 749. no. 419. t. 22. f. 17. das Langhorn.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 62. Unbek. R. Weißgestrichte Schabe mit gelblichem Unterrande.
Tin. *Porrectella* L.

Degeer

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Degeer Inf. I. t. 26. f. 15. 16.

— *Uebersf.* I. 3 Quart. p. 12.

— *Tom.* II. P. I. p. 494. no. 2.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites élevées d'un gris blanchâtre à bande longitudinale oncée brune.

Phalène teigne blanchâtre de la Juliane.

— *Uebersf.* II Th. I B. p. 364. no. 2. die weißliche Mottenphaläne der *Viola matronalis*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1572. Tin. *Porre-
tella*. Nom. *Linn*.

420. *Pedella*, die braune Dreybinde. *)

Müller l. c. p. 750. no. 420. das Querbein.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 513. Tin. *Pedella*.
Nom. *Linn*.

— *Zool.* Dan. Pr. p. 136. no. 1582. Tin. *Pedella*.

421. *Argentella*, die Silbermotte.

Müller l. c. p. 750. no. 421. Silbermotte.

Fabric. S. E. p. 658. no. 17. Tin. *Argentella*. Nom.
Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 293. no. 20. Tin. *Argentella*.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 483. no. 2. t. 10.
f. 19.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à ailes pendantes d'un blanc argenté, dont le dessous des supérieures est ardoisé, & dont l'extrémité du ventre est jaune.

Phalène argentée.

— *Uebersf.* II Th. I B. p. 357. no. 2. t. 10. f. 19.
die Silbermotte.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 135. no. 1573. Tin. *Ar-
gentella*. Nom. *Linn*.

422. *Cal-*

*) Nicht abgebildet.

422. *Calthella*, die Sumpfdottermotte. *)

Müller l. c. p. 750. no. 422. Sumpfdottermotte.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 36. Dotterblumenscha-
benraupe (*Calthae Palustris*); Dotterblumenscha-
be. Tin. *Calthella* L.

Fabric. S. E. p. 663. no. 47. Tin. *Calthella*. Nom.
Linn.

— Spec. Inf. II. p. 300. no. 64. Tin. *Calthella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 57. no. 512. Tin. *Calthella*.
Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1583. Tin. *Calthella*.

423. *Petiverella*, der Rückenstrich.

Müller l. c. p. 750. no. 423. die Schleuder.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 41. Unbek. Raupe.
Gelbgraue Goldschielende Schabe.

Fabric. S. E. p. 664. no. 49. Tin. *Petiverella*. Nom.
Linn.

— Spec. Inf. II. p. 300. no. 65. Tin. *Petiverella*.

Scharff. Icon. t. 43. f. 33.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1584. Tin. *Peti-
verella*. Nom. Linn.

424. *Swammerdammella*, das Langhorn.

Müller l. c. p. 751. no. 424. Langhorn.

Fießl. schweiz. Inf. p. 43. no. 842. Tin. *Swammer-
dammella*. In den Wiesen.

Wien. Schmett. p. 141. D. no. 2. Unbek. R. Bleich-
messingfarbene gewässerte Schabe.

Der Drontheim. Gesellich. Schr. III. p. 370. no. 36.
Tin. *Swammerdammella*.

Clerk Phal. t. 12. f. 1.

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 669. no. 13. Alucita Swammerdammella.

— *Spec. Inf. II. p. 308. no. 17. Tin. Swammerdammella.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1585. Tin. Swammerdammella. Nom. Linn.

425. *Reaumurella*, der Goldrand.

Müller l. c. p. 751. no. 425. der Goldrand.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 843. Tin. Reaumurella.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 26. Dotterweidenschabenraupe (Salicis Vitellinae); Dotterweidenschabe. Tin. Reaumurella L.

Der Dronth. Gefellsch. Schr. IV. p. 287. no. 52. Tin. Reaumurella.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 92.

Clerk Phal. t. 12. f. 2.

Fabric. S. E. p. 670. no. 17. Alucita Reaumurella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 309. no. 22. Aluc. Reaumurella.*

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1586. Tin. Reaumurella.

Geoffr. Inf. II. p. 193. no. 28.

Tinea nigra, alis exterioribus deauratis, antennis corpore duplo longioribus.

La Teigne noire bronzée.

Long. 3½ lign.

426. *Degeerella*, der Silberrand.

Müller l. c. p. 751. no. 426. Silberrand.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 844. Tin. Degeerella.

Wien.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 25. *Unbek. R. Goldgestrichte Schabe mit gelbem Querbande.*

Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 26. *Goldgestreifte Schabe.*

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 647.

Alae nigrae, fascia argenteo-aurea; antennae longae.

Long. lin. 2.

Fabric. S. E. p. 669. no. 15. *Alucita Degeerella.* Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf. II.* p. 309. no. 20. *Aluc. Degeerella.*

Geoffr. Inf. II. p. 193. no. 29. t. 12. f. 5.

Tinea nigra, alis superioribus lineis longitudinalibus, fascia lata transversa, inferneque radiis plurimis aureis; antennis corpore triplo longioribus.

La Coquille d'or.

Long. $4\frac{1}{2}$ lign.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 497. *Tin. Degeerella.* Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 136. no. 1587. *Tin. Degeerella.*
Degeer Inf. I. t. 32. f. 13.

— *Uebersf. 3 Quart.* p. 99.

— *Inf. Tom. II. P. I.* p. 487. no. 6.

Phalène à antennes filiformes trois fois plus longues que le corps, & à trompe; à ailes pendantes bronzées traversées par une bande jaune bordée de violet.

Phalène-frigane bronzée à bande jaune.

— *Uebersf. II Th. I B.* p. 359. no. 6. die *Erzfarbige gelbbandirte Phryganienphaläne.*

427. *Sulzella*, das Goldband. *)

H 2

Mül.

*) Nicht abgebildet. Diese hat *Fabric. Spec. Inf. II.* p. 309. no. 20. B. als eine Abänderung der *Degeerella* angeführt.

Müller l. c. p. 751. no. 427. *Goldband*.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 24. Unbek. R. *Goldgestrichte Schabe mit schwarzem Querbande*.

Geoffr. Inf. II. p. 199. no. 44.

Tinea nigra, alis exterioribus deauratis, capit. vertice, alarumque fascia transversa flavis.

La Teigne dorée à bande & toupet jaunes.

Long. $2\frac{3}{4}$ lign.

428. *Podaella*, das *Milchband*. *)

Müller l. c. p. 751. no. 428. *Milchband*.

Eießl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 845. Tin. *Podaella*.

Fabric. S. E. p. 670. no. 16. *Alucita Podaella*.

Nom. Linn.

--- Spec. Inf. II. p. 309. no. 21. Aluc. *Podaella*.

Geoffr. Inf. II. p. 194. no. 32. **)

Tinea nigra, fascia transversa alba.

La Teigne cordelière.

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

429. *Robertella*, das *Weisseck*. ***)

Müller l. c. p. 752. no. 429. die *weiße Ecke*.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 8. Unbek. R. *Glänzende neblicht düstre Schabe*.

Fabric. S. E. p. 669. no. 14. *Alucita Robertella*.

Nom. Linn.

--- Spec. Inf. II. p. 308. no. 18. Aluc. *Robertella*.

430. *Geoffrella*, das *Silbergitter*. †)

Müller l. c. p. 752. no. 430. *Silbergitter*.

Wien.

*) Nicht abgebildet.

**) Diese nach der Meynung der Wiener Entomol. p. 123. Linn. *Pyralis cingulata*. no. 280.

***) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

*Wien. Schmett. p. 138. C. no. 19. Unbek. R. Oker-
gelbe Schabe mit Silberstrichen und zwey hell-
gelben Dreyecken.*

*Fabric. S. E. p. 664. no. 50. Tin. Geoffrella. Nom.
Linn.*

--- *Spec. Inf. II. p. 301. no. 67. Tin. Geoffrella.*

431. *Mouffetella, der Spitzflügel. *)*

Müller l. c. p. 752. no. 431. Spitzflügel.

*Wien. Schmett. p. 140. C. no. 57. Unbek. R. Röth-
lichgraue Schabe mit 8 schwarzen Punkten.*

*Fabric. S. E. p. 664. no. 51. Tin. Mouffetella. Nom.
Linn.*

--- *Spec. Inf. II. p. 301. no. 68. Tin. Mouffetella.*

*Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 499. Tin. Mouffe-
tella. Nom. Linn.*

--- *Zool. Dan. Pr. p. 136. no. 1588. Tin. Mouffetella.*

432. *Listerella, der Halbringel. **)*

Müller l. c. p. 752. no. 432. Halbringel.

*Wien. Schmett. p. 139. C. no. 30. Unbek. R. Trüb-
graue Schabe mit schwarzpunktirtem Unterran-
de.*

433. *Frischella, der Goldbraune Flügel. ***)*

Müller l. c. p. 752. no. 433. der Vergulder.

*Wien. Schmett. p. 140. C. no. 53. Unbek. R. Schmu-
zige Goldgeglättete Schabe.*

*Fabric. S. E. p. 663. no. 48. Tin. Frischella. Nom.
Linn.*

--- *Spec. Inf. II. p. 309. no. 19. Alucita Fri-
schella.*

H 3

Mül.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 498. Tin. *Frischella*.
Nom. Linn.

--- Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1589. Tin. *Frischella*.

434. *Scopolella*, der Goldsprenkel. *)

Müller l. c. p. 753. no. 434. Goldsprenkel.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 1. Unbek. R. Schwärz-
lichte Schabe mit 8 weißen Punkten.

435. *Albinella*, der Goldbogen. **)

Müller l. c. p. 753. no. 435. Goldbogen.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 91.

436. *Goedartella*, der Silberbogen. ***)

Müller l. c. p. 753. no. 436. Silberbogen.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 558. no. 15. Tin. *Goedartella*,
die Goldfarbige Elfenmotte mit der doppel-
ten Silberweißen Binde.

Clerk Phal. t. 12. f. 14.

Fabric. S. E. p. 664. no. 33. Tin. *Goedartella*.

Alis auratis; fasciis duabus punctisque tribus
argenteis.

--- *Spec. Inf.* II. p. 302. no. 72. Tin. *Goedartella*.
In Alnetis; in Betulae gemmis.

437. *Loevenhoekella*, die Silberlinie. †)

Müller l. c. p. 753. no. 437. Silberlinie.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 76. Unbek. R. Ku-
pferglänzende Schabe mit 12 Silber- oder Blafs-
goldflecken.

438. *Merianella*, das Silberblättchen.

Müller l. c. p. 753. no. 438. Silberblättchen.

Wien.

*) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

†) Nicht abgebildet.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 31. Unbek. R. Purpurgoldne Schabe mit 3 blafsgoldnen Querbändern.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 90.

Fabric. S. E. p. 664. no. 54. Tinea Merianella. Nom. Linn.

--- Spec. Inf. II. p. 302. no. 73. Tin. Merianella.

Geoffr. Inf. II. p. 198. no. 43.

Tinea nigro-aurata lineis argenteis transversis tribus, antennis extremo-albis.

La Teigne dorée à bandes d'argent.

Long. 1 lign.

Aët. Upsal. 1736. p. 26. no. 84.

Papilio alis depressis oblongis argenteis, lineis tribus transversis aureis, media bifurca.

439. Wilkella, das Bogenband.

Müller l. c. p. 754. no. 439. Bogenband.

Réaum. Inf. III. t. 4. f. 8.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 161. no. 89.

Fabric. S. E. p. 664. no. 55. Tin. Wilkella. Nom. Linn.

--- Spec. Inf. II. p. 302. no. 74. Tin. Wilkella.

Geoffr. Inf. II. p. 199. no. 43. β.

Tinea nigro-aurata, lineis argenteis transversis quatuor, antennis nigris.

Long. 1 $\frac{3}{4}$ lign.

(Variet. Merianellae).

*440. Lyonetella, die Silberspalte. *)*

Müller l. c. p. 754. no. 440. Silberrostral.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 94.

Fabric. S. E. p. 665. no. 56. Tin. Lyonetella. Nom. Linn.

H 4

Fabric.

**) Nicht abgebildet.*

*Fabric. Spec. Inf. II. p. 302. no. 77. Tin. Lyone-
tella.*

441. *Bonnetella*, die *Silberwelle*. *)

Müller l. c. p. 754. no. 441. Wellenfilber.

Syst. Nat. du Regn. Anim. II. p. 162. no. 93.

*Fabric. S. E. p. 665. no. 57. Tin. Bonnetella. Nom.
Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 303. no. 78. Tin. Bonnetella.*

442. *Iungiella*, der *Siebenfleck*.

Müller l. c. p. 754. no. 442. Verdoppeler.

Clerk Phal. t. 12. f. 9.

Cathol. I. p. 405. Iungiella.

*Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1594. Tin. Iun-
giella. Nom. Linn.*

443. *Schefferella*, der *Buchblattminirer*. **)

Müller l. c. p. 754. no. 443. Büchenwühler.

*Gleditsch Forstwiss. I. p. 600. no. 4. Tin. Scheffe-
rella, die kleine schwarze und gelbgefleckte Buch-
motte.*

*Wien. Schmett. p. 138. C. no. 21. Büchenblattscha-
benraupe (in Fagi Sylvaticae foliis); Büchen-
blattschabe. Tin. Schefferella L.*

*Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 27. Bü-
chenminirer.*

*Fabric. S. E. p. 665. no. 58. Tin. Schefferella. Nom.
Linn.*

— *Spec. Inf. II. p. 303. no. 79. Tin. Schefferella.*

444. *Rhediella*, die *gebrochene Silberlinie*.

Müller l. c. p. 755. no. 444. Bruchfilber.

Clerk Phal. t. 12. f. 12.

Fabric.

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

Fabric. S. E. p. 665. no. 59. Tin. Rhediella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 303. no. 82. Tin. Rhediella.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 500. Tin. Rhediella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1591. Tin. Rhediella.*

445. *Roesella*, der *Apfelblattminirer*. *)

Müller l. c. p. 755. no. 445. Silberbuckel.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 847. Tin. Roesella.

Frisch Inf. III. p. 31. no. 15. 3 Pl. t. 4. f. 7. von den Räuplein unter der Pflaumenblatthaut.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 790. no. 20. Tin. Roesella, die aller kleinste Blattmotte des Apfelblatts.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 30. Apfelblattschabensraupe (in Pyri Mali foliis); Apfelblattschabe. Tin. Roesella L.

Fabric. S. E. p. 665. no. 60. Tin. Roesella. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 303. no. 83. Tin. Roesella.*

Larva 14-poda, flava, capite testaceo.

Pupa nuda, oblonga, brunnea.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 501. Tin. Roesella. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1592. Tin. Roesella.*

Degeer Inf. I. t. 30. f. 10-12.

— *Uebers. I. 3 Quart. p. 36.*

— *Inf. Tom. II. Part. I. p. 495. no. 6.*

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes étroites couleur de bronze doré à taches argentées, mais sans point noir.

H 5

Phalène-

*) Vermuthliche einerley mit *Mülleri* Tin. *Maestingella*. *Faun. Fr. p. 58. no. 521. Alis flavis linea maculisque niveis.* — *Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1603. Hierbey auch Frisch. III. t. 4. f. 7.*

Phalène-teigne dorée à taches argentées du Pommier.

— *Uebersf.* II Th. I B. p. 366. no. 6. die goldne Silbergefleckte Apfelmottenphaläne.

Réaum. Inl. III. t. 4. f. 11-15.

446. *Linneella*, der Silberpunkt.

Müller l. c. p. 755. no. 446. der *Autor*.

Clerk Phal. t. 12. f. 8.

Bekm. Epit. S. L. p. 168. no. 446. Tin. *Linneella*.

Fabric. S. E. p. 666. no. 61. Tin. *Linneella*.

Alis fusco-auratis; punctis quatuor argenteis elevatis.

— *Spec. Inf.* II. p. 304. no. 84. Tin. *Linneella*.

Geoffr. Inf. II. p. 200. no. 45.

Tinea flavo-aurata, punctis quatuor argenteis, antennarumque apice albo. Vulgo *Linnaemella*.

La *Teigne dorée à quatre points d'argent*.

Long. $2\frac{1}{3}$ lign.

447. *Rajella*, der Erlenblattminirer.

Müller l. c. p. 755. no. 447. *Erlenmotte*.

Gleditsch Forstwiss. I. p. 558. no. 16. Tin. *Rajella*, die kleine Goldfarbige, Silberweiße gedüpfelte Erlenmotte.

Swammerd. Bib. der Nat. Fol. p. 298. t. 44. f. 18-21. von den *Würmern* zwischen den beyden Häuten der Erlenblätter.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 32. Erlenblattschaben-raupe (in *Betulae Alni foliis*); Erlenblattschabe. Tin. *Rajella* L.

Fabric. S. E. p. 666. no. 62. Tin. *Rajella*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 304. no. 85. Tin. *Rajella*.

Larva

Larva pallida, capite utrinque puncto testaceo.

Pupa oblonga mucrone dentato intra folliculum extus excrementis tectum.

Degeer Inf. I. t. 31. f. 11. 12.

— *Uebers.* I. 3 Quart. p. 40.

— Inf. Tom. II. P. I. p. 495. no. 5.

Phalène à antennes filiformes, à trompe; à ailes étroites élevées dorées à taches argentées, avec un point noir proche du bout.

Phalène-teigne dorée à taches argentées de l'Aune.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 366. no. 5. die goldne, Silbergefleckte Erlenminir-Mottenphaläne.

448. *Brunnichella*, die *Violetbinde*. *)

Müller l. c. p. 755. no. 448. *Violetlinie*.

449. *Harrisella*, die *Brandspitze*. **)

Müller l. c. p. 756. no. 449. *Brandspitze*.

Fabric. S. E. p. 666. no. 63. Tin. *Harrisella*. Nom. Linn.

— *Spec. Inf.* II. p. 305. no. 88. Tin. *Harrisella*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 56. no. 502. Tin. *Harrisella*. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr.* p. 137. no. 1593. Tin. *Harrisella*.

450. *Clerckella*, die *Schwanzmotte*. ***)

Müller l. c. p. 756. no. 450. *Schwanzmotte*.

Fabric. S. E. p. 666. no. 66. Tin. *Clerckella*.

Alis argenteis, postice subcaudatis, fusco-striatis punctoque atro.

— *Spec. Inf.* II. p. 305. no. 93. Tin. *Clerckella*.

In

*) Nicht abgebildet.

**) Nicht abgebildet.

***) Nicht abgebildet.

In *Europae Nemoribus*.451. *Occultella*, die *Fenstermotte*. *)*Müller* l. c. p. 756. no. 451. *Fenstermotte*.*Degeer* Inf. I. Uebersf. 3 Quart. p. 32.452. *Lichenella*, die *Moosmotte*.*Müller* l. c. p. 756. no. 452. *Flechtenmotte*.*Degeer* Uebersf. I. 3 Quart. p. 78.— Inf. Tom. II. Part. I. p. 380. no. 4. t. II. f. 5.
6.*Phalène* à antennes filiformes, sans trompe, dont la femelle est sans ailes; d'une chenille-teigne des murs à fourreau prismatique fait de grains de pierre.*Phalène-teigne des murs à court fourreau prismatique*.— Uebersf. II Th. I B. p. 276. no. 4. t. II. f. 1. 6.
die *Mauermottenphaläne* mit kurzem dreyeckigem Gehäuse.*Fabric*. Spec. Inf. II. p. 306. no. 94. Tin. *Lichenella*.

Aptera laevis nigra.

Larva 16-poda, laevis, obscure grisea, postice incrassata, intra cucullum triangulari prismaticum ex arena constructum.*Unabgebildete Linnéische Motten.*1) no. 353: *Crataegella*.2) no. 357. *Oxyocanthella*.3) no. 359. *Pascuella*.4) no. 362. *Rorella*.5) no. 364. *Nemorella*.6) no. 366. *Ramella*.7) no. 370. *Vestionella*.

8) no.

*) Nicht abgebildet.

- 8) no. 380. *Arbutella*.
- 9) no. 381. *Tessella*.
- 10) no. 384. *Parenthesella*.
- 11) no. 385. *Elongella*.
- 12) no. 386. *Punctella*.
- 13) no. 388. *Tetrapodella*.
- 14) no. 390. *Cinctella*.
- 15) no. 391. *Leucotella*.
- 16) no. 392. *Cinerella*.
- 17) no. 393. *Trigonella*.
- 18) no. 394. *Rhomboidella*.
- 19) no. 395. *Tertianella*.
- 20) no. 396. *Scabrella*.
- 21) no. 397. *Asperella*.
- 22) no. 398. *Serratella*.
- 23) no. 399. *Populella*.
- 24) no. 400. *Mercurella*.
- 25) no. 405. *Cembrella*.
- 26) no. 408. *Iuniperella*.
- 27) no. 409. *Fuscella*.
- 28) no. 410. *Minutella*.
- 29) no. 411. *Corticella*.
- 30) no. 413. *Sylvella*.
- 31) no. 416. *Aristella*.
- 32) no. 417. *Caudella*.
- 33) no. 418. *Capitella*.
- 34) no. 420. *Pedella*.
- 35) no. 422. *Calthella*.
- 36) no. 427. *Sulzella*.
- 37) no. 428. *Podaella*.
- 38) no. 429. *Robertella*.
- 39) no. 430. *Geoffrella*.
- 40) no. 431. *Monffetella*.
- 41) no. 432. *Listerella*.
- 42) no. 433. *Frischella*.

43) no.

- 43) no. 434. *Scopolella*.
- 44) no. 435. *Albinella*.
- 45) no. 437. *Loevenhoekella*.
- 46) no. 440. *Lyonetella*.
- 47) no. 441. *Bonnetella*.
- 48) no. 443. *Schefferella*.
- 49) no. 448. *Brunnichella*.
- 50) no. 450. *Clerckella*.
- 51) no. 451. *Occultella*.

Neue Arten von Motten:

1. *Tinea cauda piscina*, die *Fischschwanzmotte*.
Naturforscher II St. p. 14. t. I. f. 6. (D. Kühn.)
2. *Aureo-polita*, der *Goldglanz*.
Naturforscher III. p. 8. f) t. I. f. 8. (D. Kühn.)
Füßl. Magaz. der Entomol. II. p. 107.
Schaeff. Icon. t. 19. f. 4. 5.
3. *Quadrioculata*, das *Vierauge*.
Naturforscher III. p. 8. g) t. I. f. 9. die fahlbraune vieräugige Motte, welche fast die Gestalt einer Frühlingsfliege hat (D. Kühn).
Füßl. Magaz. der Entom. II. p. 107.
Schaeff. Icon. t. 278. f. 4-7.
4. *Aleella*, die *gelbbraunrothgefleckte Motte*.
Naturforscher IX. p. 106. t. 2. (Schulze).
 Alis oblongis flavis, maculis fulvis alternis,
 strigaeque undulata argentea.
In Germaniae Pratis.
5. *Chocolatella*, die *Chokolatenmotte*.

Bonnets Betracht. über die Natur p. 457. (Note *Spallanzani*).

Martini allgem. Gesch. der Nat. I. p. 633.

Alis griseis, pallide-flavis, nigro-punctatis maculatisque.

6. *Fueslinella*, die *Füßlismotte*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 13. die Vorderflügel schwarz; die hintern braun; auf dem Kopfe und zu beyden Seiten des Bruststücks Orangelbe Flecken; auf den Vorderflügeln weiße Tropfen.

7. *Proboscidella*, der *Schnauzbart*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 14. die Flügel braun, mit einem Goldgelben Bande der Länge nach durchzogen, nebst einem rothgelben Fleck und Saum.

8. *Viciella*, *Wickenschabe*.

Wien. Schmett. p. 133. A. *Scheinspinner*schaben (Ph. Tin. Bombyciformes): no. 2. *Wickenschabenraupe* (*Viciae Sylvaticae*), Tab. I. a. f. 7. *Wickenschabe*, Tab. I. b. f. 7.

Geoffr. Inf. II. p. 203. no. 52.

Tinea involucro ex paleis transversis composito.

La Teigne à fourreau de pailles transverses.

Fourreau à sept à huit lignes de long.

Degeer Inf. I. p. 511. t. 29. f. 23-25.

Chenille-teigne à seize jambes, rase, noirâtre, qui vit sur l'Ozier, & qui se fait un fourreau couvert de brins de gramen, qui sont placés transversalement sur le fourreau.

Uebers. I. 3 Quart. p. 80. t. 29. f. 23-25.

9. *Muscella*,

9. *Muscella*, *Fliegenflüchtige Schabe.*

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 3. Unbek. Raupe.

10. *Bombycella*, *gelblichte düstere gewässerte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 4. Unbek. R.

11. *Pedinella*, *Aschgraue durchsichtige Schabe.*

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 5. Unbek. R.

12. *Plumella*, *schwärzlichte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 133. A. no. 6. Unbek. R.

13. *Palpella*, *braungelblichte Schabe mit 2 geraden Silberstreifen.*

Wien. Schmett. p. 134. B. Geradschnauzigte Schaben, Ph. Tin. Direotipalpes: no. 3. Unbek. R.

14. *Margaritella*, *braune Schabe mit Silberartigem Geradstreife.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 5. Unbek. R.

Geoffr. Ins. II. p. 183. no. 3.

Tinea cinerea, corniculis duobus cristatis, fascia alarum longitudinali argentea.

La Teigne à rayure d'argent.

Long. 4 lign.

15. *Conchella*, *gelbbraune Schabe mit 2 Silberartigen Flecken.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 6. Unbek. R.

16. *Inquinatella*, *gelblichte am Innenrande trübe Schabe.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 10. Unbek. R.

17. *Exoletella*, *Beinfarbene graugestrichte Schabe.*

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 12. Unbek. R.

18. *Stra-*

18. *Straminella*, Strohfarbige Schabe.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 13. Unbek. R.

19. *Luteella*, Okergelbe Schabe.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 14. Unbek. R.

20. *Convolutella*, Lichtgraue Schabe.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 15. Unbek. R.

21. *Falsella*, weißlichglänzende dunkelgezeichnete Schabe.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 16. Unbek. R.

22. *Tristella*, grau und braungemischte Schabe.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 17. Unbek. R.

23. *Quercella*, Eichenschabe.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. 18. Eichenschabenraupe (*Quercus Roboris*).

24. *Antennella*, gelblichte, weißschielende Schabe.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 19. Unbek. R.

25. *Pyralella*, weißlichte Schabe mit grauen Quersflecken.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 20. Unbek. R.

26. *Alpella*, blaßschwefelgelbe olivgestrichte Schabe.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 21. Unbek. R.

27. *Ceruffella*, graue Schabe mit silberner Untenrandlinie.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 22. Unbek. R.

28. *Quadrella*, weiße Schabe mit gestrichtem Untenrande.

130 *Lepidoptera*. 233. *Phalaena Tinea*.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 23. *Unbek. R.*

29. *Striatella*, graue Schabe mit weißen Geradstri-
chen.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 26. *Unbek. R.*

30. *Gigantella*, grofse graugelbe Schabe mit langen
Schnauzen.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 27. *Unbek. R.*

31. *Argyrella*, filberne graugesprenkelte Schabe.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 28. *Unbek. R.*

32. *Anella*, graugemischte Schabe mit 2 Mittelrin-
gen.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 30. *Unbek. R.*

33. *Canella*, grauröthliche Schabe ohne Ringe.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 31. *Unbek. R.*

34. *Ahenella*, glänzende schwarzgraulichte Schabe.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 32. *Unbek. R.*

35. *Alternella*, weifsgraue Schabe mit breiten düstern
Querstreifen.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 33. *Unbek. R.*

36. *Fagella*, Büchenschabe.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 34. *Buchenschaben-
raupe (Fagi Sylvaticae).*

37. *Noctuella*, bräunlichte Schabe mit düstern Ring-
und Nierenflecken.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 35. *Unbek. R.*

38. *Verbascella*, Wollkrautschabe.

Wien.

*Wien. Schmett. p. 136. B. no. 36. Wollkrautschaben-
raupe (Verbasci Tapfi).*

39. *Daphnella, Zeidelbastschabe.*

*Wien. Schmett. p. 136. B. no. 37. Zeidelbastschaben-
raupe (Daphnes Mezerei).*

40. *Nyctemerella, weisse Schabe mit schwarzen Rand-
flecken.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 38. Unbek. R.

41. *Dilutella, graue, düstergezeichnete Schabe.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 40. Unbek. R.

42. *Barbella, dunkelgraue Schabe.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 43. Unbek. R.

43. *Bracteella, rothgoldene Schabe.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 44. Unbek. R.

44. *Falcella, gelbbraune Schabe mit gefichelten Ober-
flügeln.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 47. Unbek. R.

45. *Apicella, graugelbe Schabe mit spitzigem Aussen-
winkel der Oberflügel.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 48. Unbek. R.

46. *Uncella, Erdfarben und weissgemischte Schabe mit
geficheltem Aussenwinkel der Oberflügel.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 49. Unbek. R.

47. *Harpella, Zimmtbraune Schabe mit gelbem In-
nenrande und gefichelten Oberflügeln.*

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 50. Unbek. R.

48. *Ciliella*, goldbraune Schabe.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 51. Unbek. R.

49. *Genistella*, Gilbkrautschabe.

*Wien. Schmett. p. 137. B. no. 52. Gilbkrautschaben-
raupe (Genistae tinctoriae).*

50. *Pyropella*, bleichgelbe Schabe mit finsterem Auf-
senrande.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 53. Unbek. R.

51. *Albidella*, weissgraue Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 56. Unbek. R.

52. *Humerella*, Okerbraune Schabe mit weissem Auf-
senrande der Oberflügel.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 57. Unbek. R.

53. *Nitidella*, Silberweisse Schabe mit goldfarbiger
Zeichnung.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 58. Unbek. R.

54. *Mendicella*, schwarzbraune Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 59. Unbek. R.

55. *Choragella*, glänzend Holzfarbichte dunkelge-
zeichnete Schabe.

*Wien. Schmett. p. 137. C. Krummschnauzichte Scha-
ben, Ph. Tin. Recurvipalpes: no. 1. Unbek. R.*

56. *Characterella*, graulichte Schabe mit Sförmigem
Mittelzeichen.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 2. Unbek. R.

57. *Arenella*, bleichsandfarbige Schabe mit Bleyfarbe-
nem Mittelpunkt.

Wien.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 3. Unbek. R.

58. *Liturella*, gelblichte Schabe mit niederen dunklen Flecken.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 4. Unbek. R.

59. *Daucella*, Möhrenschabe.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 5. Möhrenschabenraupe (Dauci Carotae).

60. *Atomella*, graulichte dunkelgesprengte Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 6. Unbek. R.

61. *Laterella*, Ziegelfarbigte Schabe.

Wien. Schmett. p. 137. C. no. 7. Unbek. R.

62. *Verrucella*, vorwärts Zimmetrothe, rückwärts düstere Schabe mit einer Warze.

*Wien. Schmett. p. 138. C. no. 8. *)*

63. *Lobella*, graue Schabe mit 3 schwarzen Hökern.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 9. Unbek. R.

64. *Putridella*, Holzbräunliche Schabe mit einem kleinen weissen Mittelpunkt.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 10. Unbek. R.

65. *Monilella*, weißlichte Schabe mit einem bunten Makel am Außenrande.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 11. Unbek. R.

66. *Roborella*, Hageeichenschabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 14. Hageeichenschabenraupe (Quercus Roboris).

*) Die Raupe auf dem Kellerhals oder Zeiland, Daphne Mezereum.
S. Nachtrag p. 319. Note.

67. *Palumbella*, graue Schabe mit 2 röthlichen Querstrichen.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 15. Unbek. R.

68. *Abietella*, Tannenschabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 19. Tannenschabenraupe. (Pini abietis. Clus.)

69. *Adscitella*, grauglänzende Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 20. Unbek. R.

70. *Procerella*, goldgelbe Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 21. Unbek. R.

71. *Tetricella*, düsterglänzende Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 22. Unbek. R.

72. *Denifella*, gelbgraue weisgesfleckte Schabe.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 23. Unbek. R.

73. *Lipsiella*, Hirschfarbene Schabe mit einer weislichten Nerve.

Wien. Schmett. p. 138. C. no. 24. Unbek. R.

74. *Tremella*, Zitterpappelschabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 27. Unbek. R.

75. *Cristella*, hellgraue Schabe mit schwarzen Randflecken.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 28. Unbek. R.

76. *Turpella*, düster und blasgraugemischte Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 29. Unbek. R.

77. *Umbrella*, graugelbe glänzende Schabe mit düstern Flecken.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 31. Unbek. R.

78. Ob-

78. *Obsoletella*, Staubfarbige Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 32. Unbek. R.

79. *Plumbella*, Bleyfarbene Schabe mit schwarzer Mittelmakel und schwarzen Punkten.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 34. Unbek. R.

80. *Violella*, glänzende düster Veilrothe Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 35. Unbek. R.

81. *Laevigella*, braune Schabe mit Goldstäubchen.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 36. Unbek. R.

82. *Laetella*, glänzend braungemischte Schabe mit weissem Kopfe und Rücken.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 37. Unbek. R.

83. *Rhombella*, Holzfarbige schwarzgezeichnete Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 38. Unbek. R.

84. *Obscurella*, düstere Schabe mit bleichem Aussenrandpunkte.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 39. Unbek. R.

85. *Aquella*, bleiche Schabe mit dunkler Zeichnung.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 40. Unbek. R.

86. *Alabastrella*, weisse Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 41. Unbek. R.

Geoffr. Inf. II. p. 168. no. 115.

Phalaena feticornis spirilinguis alba, oculis nigris, antennis pedibusque subflavescentibus.

L' albâtre.

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

87. *Vulgella*, graue Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 44. Unbek. R.

88. *Terfella*, bleiche Schabe.

Wien. Schmett. p. 139. C. no. 45. Unbek. R.

89. *Sisymbrella, Wellensamenschabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 46. Wellensamenschabenraupe (Sisymbrii Sophiae).

90. *Formosella, gelbe Schabe mit silbernem Aussenrandmakel.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 47. Unbek. R.

91. *Pedisequilla, bleichglänzende Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 48. Unbek. R.

92. *Terrella, röthlichgraue Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 49. Unbek. R.

93. *Laminella, glänzende dunkelstahlgrüne Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 51. Unbek. R.

94. *Nebulella, Aschgraue Schabe mit schwarzen Punkten.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 52. Unbek. R.

95. *Echiella, Natterkopfschabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 54. Natterkopfschabenraupe (Echii vulgaris).

96. *Derafella, bleichbraune Schabe.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 56. Unbek. R.

97. *Cuspidella, schwarzbraune Schabe mit 4 weißlichen Streifen.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 58. Unbek. R.

98. *Micella, stahlgrüne Schabe mit blausilbernen Punkten.*

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 59. Unbek. R.

99. *Atrella,*

99. *Atrella*, blauschwarze Schabe mit 4 weißen Punkten.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 60. Unbek. R.

100. *Pennella*, Silberweißgestrichte Schabe.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 61. Unbek. R.

101. *Eburnella*, Helfenbeinfarbene gelbgestrichte Schabe.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 63. Unbek. R.

102. *Variella*, graue bleichgefleckte Schabe.

Wien. Schmett. p. 140. C. no. 64. Unbek. R.

103. *Epilobiella*, Weidrichsröschenschabe.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 65. Weidrichsröschen-
schabenraupe (*Epilobii hirsuti*).

104. *Sparsella*, weißliche schwarzgesprengte Schabe.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 67. Unbek. R.

105. *Nanella*, schwarzgrau und weißgemischte Schabe.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 68. Unbek. R.

106. *Opimella*, bräunlichte Schabe mit silbernem Mittelraume.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 69. Unbek. R.

107. *Pygmaeella*, Goldfarbige Schabe mit bleichem Innenrande.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 70. Unbek. R.

108. *Locupletella*, goldene und silberne Schabe mit düsterm Unterlande.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 71. Unbek. R.

109. *Dimidiella*, halbgelb und halbschwarze Schabe.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 72. Unbek. R.

110. *Pumilella*, weiß und graue Schabe.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 73. Unbek. R.

111. *Accessella*, graubraune Schabe mit bleichgelben Flecken.

Wien. Schmett. p. 141. C. no. 74. Unbek. R.

112. *Majorella*, goldbraun gezeichnete Schabe.

Wien. Schmett. p. 141. D. Schnauzenlose Schaben,
Ph. Tin. Impalpes: no. 1. Unbek. R.

113. *Membranella*, mattgelbe durchsichtige Schabe.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 3. Unbek. R.

114. *Rubricella*, braunröthliche kleingestrichte Schabe.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 5. Unbek. R.

115. *Pilella*, glänzend düstergraue Schabe.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 6. Unbek. R.

116. *Ephemerella*, weißliche fast durchsichtige Schabe.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 9. Unbek. R.

117. *Spretella*, Aschgraue Schabe mit schwarzen Punkten.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 10. Unbek. R.

118. *Maurella*, glänzenschwarze Schabe.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 11. Unbek. R.

119. *Ferrugella*, Goldgelbe bräunlichgemischte Schabe.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 14. Unbek. R.

120. *Pronubella*, Trübgoldschielende Schabe mit gelben Unterflügeln.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 16. Unbek. R.

121. *Taurella*, grau und schwärzlichte Schabe mit knottigen Fühlhörnern.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 17. Unbek. R.

122. *Miscella*, düstergelb und blaugemischte Schabe mit Hökern.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 18. Unbek. R.

123. *Aurella*, rothgoldene Schabe mit silbernem Querbande.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 19. Unbek. R.

124. *Schiffermillerella*, rothgoldene Schabe mit stahlblauem Querbande.

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 20. Unbek. R.

125. *Exiguella*, düstere Schabe mit weislichem Querstriche.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 21. Unbek. R.

126. *Flavifrontella*, grauglänzende Schabe mit gelbem Kopfe.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 22. Unbek. R.

127. *Obuiella*, Aschgraue Schabe mit gelblichem Innenrande.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 23. Unbek. R.

128. *Albinigrella*, schwärzlichte Schabe mit 8 weissen Makeln.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 27. Unbek. R.

129. *Masculella*, grauglänzende Schabe mit zwey weissen Innenrandpunkten.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 28. Unbek. R.

130. *Fibulella*, Purpurschielende Schabe mit einem goldenen Gemeinmakel.

Wien.

Wien. Schmett. p. 143. D. no. 33. Unbek. R.

131. *Metallella*, dunkelgoldne Schabe mit 6 Silberzeichen.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 34. Unbek. R.

132. *Cydoniella*, Quittenblattschabe.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 35. Quittenblattschabenraupe (in Pyri Cydoniae foliis).

133. *Rejesta*, grauglänzende Schabe mit einem schwärzlichen Punkte.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 37. Unbek. R.

134. *Irella*, grauliche dunkelgefleckte Schabe.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 39. Unbek. R.

135. *Alucitella*, goldglänzende Schabe mit 2 düstern Quersflecken.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 40. Unbek. R.

136. *Hemidactylella*, oraniengelbe rothbraunpunktirte Schabe.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 41. Unbek. R.

137. *Microdactylella*, weisse Schabe mit Goldgelben Winkelfstreifen.

Wien. Schmett. p. 144. D. no. 42. Unbek. R.

138. *Hirsutella*, Schwingelschabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 318. ad A. Schwingelschabenraupe (Festuca ovinae et elatioris).

139. *Legatella*, breitflügelichte graue Schabe mit einem langen Silberstreife.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

140. *Tribunella*, breitflügelichte graue Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

141. *Centuriella*, blafsgraue braungelb und düfterfleckichte Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

142. *Combinella*, Silberweifse, auswärts braungelbe Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

143. *Marginella*, glänzende bräunliche Schabe mit einer weifsen Außenrandlinie.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

144. *Tripunctella*, Flachsbräunliche Schabe mit drey schwarzen Punkten.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Unbek. R.

145. *Perficella*, Pfirsichschabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Pfirsichschabenraupe (*Amygdali Perficæ*).

146. *Bififfella*, Pflaumenschabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad B. Pflaumenschabenraupe (*Pruni domesticæ*).

147. *Ornatella*, hellbraune blaulichtweißgestrichelte Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

148. *Ligulella*, Sammetfchwarze Schabe mit einem weifsen Querstriche.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

149. *Festivella*, Goldgelb und Silberweiß gemischte Schabe mit erhobenen braunen Fleckchen.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

150. *Albipunctella*, Ruffarbene Schabe mit 3 weifsen Punkten.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

151. *Aeneella*, grünlichtgoldene Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

. 152. Mi-

152. *Minimella*, düstergoldne Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 319. ad C. Unbek. R.

153. *Splendella*, blankbraune Schabe mit röthlichsilber-
nem Innenrande und Punkte.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

154. *Cuprella*, ganz rothgoldne Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

155. *Rupella*, dunkelrothgoldene Schabe mit 4 runden
Silbermakeln.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

156. *Praelatella*, blankveilrothe Schabe mit 2 silbernen
Eckmakeln und einem Querstriche.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

157. *Argyrodaetyla*, silberne Schabe mit schwarzgestri-
cheltem Untenrande und Kielförmigen Unterflü-
geln.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

158. *Erythrodaetyla*, röthlichgelbe dunkelrothfleckichte
Schabe.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. ad D. Unbek. R.

159. *Perlella*, die Perlmotte.

Scop. Entom. carn. p. 243. no. 620.

Alae supra eodem prorsus, quo perla, colore
fulgidae; subtus fuscescentes.

In Pratis. Long. lin. 6.

Wien. Schmett. p. 134. B. no. II. glänzend Perlfar-
bichte Schabe. Unbek. R.

Knochs Beytr. zur Insektengesch. I St. p. 68. t. 4. f.
6. Ph. Tin. *Perlella*, die Perlmotte.

Tinea alis oblongis margaritato-fulgidis, sub-
tus furvis.

160. *Semirubella*, der *Halbröthling*.

Scop. Entom. carn. p. 245. no. 623.

Alae anticae vinaceae, femipaleaceae.

In *Gramineis*. *Long.* lin. 6.

161. *Rosella*, die *halbrosenfarbige Motte*.

Scop. Ent. carn. p. 245. no. 624.

Alae anticae albae, femiroseae. Occiput aureum.

In *herbidis collibus*. *Long.* lin. 4.

162. *Viduela*, der *Einsiedler*.

Scop. Ent. carn. p. 245. no. 625.

Alae anticae albae; linea fusca, a basi ad apicem prope marginem crassiore decurrente.

In *Sylvis*, rarior et solitaria. *Long.* lin. $4\frac{1}{3}$.

163. *Fuscella*, der *Braunpunkt*.

Scop. Ent. carn. p. 245. no. 626.

Alae canescentes, fusco-punctatae.

In *montanis nostris*. *Long.* lin. 4.

164. *Craterella*, die *Achtlinie*.

Scop. Ent. carn. p. 246. no. 627.

Alae anticae albae; lineis longitudinalibus octo binisque transversis ferrugineis.

In *Gramine*. *Long.* lin. $5\frac{1}{3}$.

165. *Chrysonuchella*, der *Streupunkt*.

Scop. Ent. carn. p. 246. no. 628.

Alae albae, margine crassiore, punctulis sparsis, strigisque binis transversis fusciscentibus.

In *pratis*. *Long.* lin. $5\frac{2}{3}$

*Wien. Schmett. p. 134. B. no. 8. weisliche Schabe
mit einem Silberbogen und Untenrande. Unbek.
R.*

166. *Virginella*, das Jüngferchen.

Scop. Ent. carn. p. 246. no. 629.

*Pallida tota et albicans; alis anticis maculis
duabus albidissimis, anteriore conica, posteriore
quadrata.*

In Nemoribus. Long. lin. 5.

167. *Cornutella*, das Zweyhorn.

Scop. Ent. carn. p. 247. no. 633.

Tota ossea et polita; palpis erectis.

In pratis. Long. lin. 5½.

168. *Marginella*, der Blafsrand.

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 635.

*Pallide caryophyllina; alis anticis margine
crassiore pallidior punctisque (6-7) caryophyl-
linis variegato, fimbria subargentea.*

In Pomariis circa Idriam. Long. lin. 3½.

169. *Palliatella*, das Schwarzauge.

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 636.

Ossea tota, alis impositis, oculis nigris.

In Nemoribus nostris. Long. lin. 7.

170. *Cervinella*, die Hirschhornfarbige Motte.

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 637.

*Alae cervinae; anticae punctis posticis nigris
(4) in margine crassiore, (7) in exteriore. Cor-
pus subtus subargenteum.*

In Pratis. Long. lin. 5½.

171. *Forficella*, der Goldkopf.

Scop. Ent. carn. p. 248. no. 638.

Alae

Alae anticae fusco-ferrugineae; capite, striga a basi ad angulum posticum extensa, maculaque obliqua postica marginis crassioris, *subaurei coloris*.

In *Sylvis*. Long. lin. 5.

172. *Flavella*, der Gelbling.

Scop. Ent. carn. p. 249. no. 639.

Caput, dorsum, alae anticae supra flavae ferrugineo-subfasciatae.

In *Nemoribus umbrosis*. Long. lin. $4\frac{1}{2}$.

173. *Gemmatella*, die Juwelenmotte.

Scop. Ent. carn. p. 249. no. 640.

Alae anticae flavescentes; fasciis ferrugineis punctisque argenteis variegatae.

In *Collibus nostris*. Long. lin. $3\frac{3}{4}$.

Wien. Schmett. p. 135. B. no. 25. Gelbliche Schabe mit zwey bräunlichten Bändern. Unbek. R.

174. *Eclipsella*, der Dickrand.

Scop. Ent. carn. p. 249. no. 641.

Obscure cana; alis anticis margine crassiore nigro-punctatis.

In *Pratis*. Long. $3\frac{1}{3}$.

175. *Mucronella*, der Lanzettenflügel.

Scop. Ent. carn. p. 250. no. 643.

Alae omnes lanceolatae, mucronatae, nitidae, concolores, pallidae; anticae longitudinaliter fusco-sublineatae.

Unicam collegi circa *Idriam*.

Long. lin. $6\frac{1}{2}$.

Wien. Schmett. p. 136. B. no. 45. Unreinstrohfärbichte Schabe. Unbek. R.

176. *Scabiosella*, die *Skabiosenmotte*.

Scop. Ent. carn. p. 250. no. 644.

Alae anticae auratae, margine subtusque una cum posticis utrinque haematiticae lucidae. Antennae alis longiores, albae, basi nigricantes.

In Floribus *Scabiosae officin.*

Long. lin. 4.

Poda Mus. Graec. p. 94. Metallica.

Friesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 846. Tin. Scabiosella Scop. Auf den wilden Skabiosen.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 16. die Skabiosenmotte.

177. *Viridella*, der *Goldgrünling*.

Scop. Ent. carn. p. 250. no. 645.

Alae anticae viridi-auratae. Femora postica barbata.

In *Sylvis Idriensibus. Long. lin. 3 $\frac{1}{3}$.*

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 4. Mattgrüngoldglänzende Schabe. Unbek. R.

178. *Barbatella*, der *Bartling*.

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 646.

Alae anticae glaucae, aurato-punctatae. *Palpi barbati.* Antennae alis longiores, apice albidae.

In *Collibus gramineis Carnioliae super.*

Long. lin. 2 $\frac{1}{3}$.

179. *Croesella*, die *Goldlinie*.

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 648.

Alae sature violaceae, anticae fascia, basi et apice, lineisque longitudinalibus (5 - 7) aureis. Antennae longissimae albidae.

In *Evonymo vulgari.*

Long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

180. *Rufimitrella*, das Rauchmützgen.

Scop. Ent. carn. p. 251. no. 649.

Caput lana rufa vestitum. Corpus nigrum.

Alae fuscae, anticae supra fusco-viridi aeneae.

In *Sylvestribus*. *Long. lin. 2½.*

Wien. Schmett. p. 142. D. no. 15. Bräunlicht - Mes-
singfarbige Schabe. Unbek. R.

181. *Hemerobiella*, die Hemerobienmotte.

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 650.

Alae anticae canae, fusco-punctulatae. Ti-
biae posticae plumosae.

Frisch Inf. I. p. 37. 3 Pl. t. XI. f. 1-6. von der Blatt-
motte, die mit aufgerichteter gerader Hülse fort-
*kriecht. *)*

182. *Obscurella*, der Dösterling.

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 652.

Fusca; alis anticis supra fusco-auratis, apice
subhaematiticis.

In *Carniolia inferiore*.

Long. lin. 3.

183. *Fenestrella*, die Fenstermotte.

Scop. Ent. carn. p. 252. no. 653.

Alae anticae albae; maculis punctisque ni-
gris, postice nebula subaurata.

Circa *fenestras* occurrit primo vere.

Long. lin. 3.

184. *Scaella*, die Treppenmotte.

Scop. Ent. carn. p. 253. no. 654.

Alae anticae albae; tribus paribus punctorum
nigrorum, contiguorum, totidem obliquas ae-
que distitas veluti fascias praeferentium.

K 2

Ruri.

*) Dies die perpendicular stehenden braunen Bälglein auf den
Apfel- und Birnblättern.

148 *Lepidoptera. 233. Phalaena Tinea.*

Ruri. Long. lin. 2.

185. *Punctella*, der *Punktling*.

Scop. Ent. carn. p. 253. no. 655.

Alae anticae niveae; punctis fufcescentibus,
in apice confluentibus variegatae.

Ruri inter Corylos. Long. lin. 2½.

186. *Comella*, das *Weißhaar*.

Scop. Ent. carn. p. 253. no. 656.

Capillitium album, alba coma per marginem
alae internum decurrente auctum. Alae anticae
ferrugineae fascia obscuriore, obsoleta, obliqua.

Circa domos et hortos.

Long. lin. 2¼.

187. *Pusiella*, der *Zwerg*.

Scop. Ent. carn. p. 253. no. 657.

Alae anticae cauda repanda terminatae, posticae
lineares.

In Pratis. Long. lin. 1½.

188. *Thrafonella*, der *Praler*.

Scop. Ent. carn. p. 253. no. 658.

Alae anticae fusco-auratae, lineis strigisque
transversis argenteis, macula nigra ad angulum
posticum, in qua puncta tria argentea.

In herbidis paludosis.

Long. lin. 2⅔.

189. *Equitella*, das *Pferdeschwänzchen*.

Scop. Ent. carn. p. 254. no. 659.

Alae anticae caudula e margine exteriori nata,
loboque terminatae; lituris in margine eodem
quinis, in opposito vero binis argenteis.

In herbidis paludosis.

Long. lin. 2⅓.

190. *Arun-*

190. *Aruncella*, *Schwarzwurzelmotte.*

Scop. Ent. carn. p. 254. no. 660.

Alae anticae auratae, cum intermixto violaceo-rubro colore, fronte aureis pilis pubescente.

In Paniculis *Aëteae*, *Arunci.*

Long. lin. $1\frac{1}{4}$.

191. *Alchimiella*, *der Lanzettenfleck.*

Scop. Ent. carn. p. 254. no. 661.

Alae anticae aureae, striga transversa, antica, maculaque lanceolata apicis, laccae colore.

Circa *Idriam.* *Long.* lin. $2\frac{1}{2}$.

192. *Aureatella*, *der Goldröthling.*

Scop. Ent. carn. p. 254. no. 662.

Alae anticae rubro-auratae, fascia maculisque aureis.

In *Sylvestribus locis.* *Long.* lin. $2\frac{1}{3}$.

193. *Aeneella*, *der Kupferkönig.*

Scop. Ent. carn. p. 255. no. 663.

Fusca tota, alis anticis aeneo-fuscis.

In *Sylvis.* *Long.* lin. 3.

194. *Leucocerella*, *der weiße Doppelpunkt.*

Scop. Ent. carn. p. 255. no. 664.

Alae anticae aurato-rubrae, punctis binis obsoletis albis.

In *Sylvis.* *Long.* lin. 2.

195. *Luridella*, *der Schmutzling.*

Scop. Ent. carn. p. 255. no. 665.

Alae argenteae, anticae atomis punctisque fuscis inquinatae. Caput cum thorace album.

Circa *Labacum.* *Long.* lin. $3\frac{1}{2}$.

196. *Zoolegella*, *die Thiermotte.*

Scop. Ent. carn. p. 255. no. 666.

Pallide cervina; alis anticis puncto postico nigro.

In *Avium exuviis*, et *Insectis adservatis*, praesertim *Cancris*.

Huic proxima, et forte eadem, Phal. Tin. *Pel-lionella* Linn. no. 372, sed nostra non est cana.

Long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.

197. *Rufella*, der *Fuchs*.

Scop. Ent. carn. p. 255. no. 667.

Alae griseo-cinereae, corpore pedibusque rufis.

Circa *Labacum*. *Long. lin. 2 $\frac{1}{2}$.*

198. *Murinella*, das *Mäuslein*.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 668.

Alae pallide murinae.

In *Carniolia inferiore*. *Long. lin. 3.*

Wien. Schmett. p. 137. B. no. 55. Mausfarbichte Schabe. Unbek. R.

199. *Arbustella*, die *Strauchmotte*.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 670.

Alae anticae subargenteae, puncto nigro.

Inter *arbusta*. *Long. lin. 1 $\frac{1}{2}$.*

200. *Domesticella*, die *Hausmotte*.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 671.

Albida nitens, alis omnibus apice utrinque nigro nebulosis.

In *Cubilibus*. *Long. lin. 3.*

201. *De Bornella*, die *Goldbinde*.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 118. no. 137.

Antennis longissimis; alarum anticarum lineis aureis

aureis nigrisque, et fascia aurea violaceo margine moeniata.

Circa *Schemnitz.* Long. alae ant. lin. 5-6.

202. *Gronoviella*, das *Mohrenkind*.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 119. no. 138.

Alis nigris, punctis aureo-argenteis 8-9; marginalibus tribus maioribus.

Circa *Schemnitium.*

Alae anticae Long. lin. 4.

203. *Vandelliella*, die *Violetlinie*.

Scop. Ann. 5. hist. nat. p. 119. no. 139.

Alae anticae aureae; linea media violacea, fascia versus basin argentea, violaceo-marginata.

Circa *Schemnitium.* Statura prioris.

204. *Cornella*, die *Korneelkirschenmotte*.

Fabric. S. E. p. 657. no. 8.

Alis niveis, fascia punctisque numerosis fuscis.

Habitat in *Saxoniae corno*.

— Spec. Inf. II. p. 291. no. 11. Tin. *Cornella*.

205. *Nigrella*, der *Rothafter*.

Fabric. S. E. p. 658. no. 19.

Nigra, alis fuscis, abdomine rufo.

In *Daniae Nemoribus*.

— Spec. Inf. II. p. 294. no. 24. Tin. *Nigrella*.

206. *Cryptella*, die *ostindianische Wellenstreife*.

Fabric. S. E. p. 658. no. 20.

Alis griseis, linea dimidiata albissima strigaeque postica undata, argentea.

In *India orientali*.

— Spec. Inf. II. p. 294. no. 25. Tin. *Cryptella*.

207. *Limbella*, der *Saumflügel*.

Fabric. S. E. p. 660. no. 27.

Alis ciliatis, exalbidis, limbo maculisque fuscis.

In *Germaniae Nemoribus*.

— *Spec. Inf. II. p. 296. no. 35. Tin. Limbella.*

208. *Undella*, die *Wellenmotte*.

Fabric. S. E. p. 661. no. 35.

Alis fusco-cinereis; lineola media fasciaque posticae undatis, albis.

— *Spec. Inf. II. p. 297. no. 47. Tin. Undella.*
In *Germania*.

209. *Compositella*, der *Rückenfleck*.

Fabric. S. E. p. 663. no. 46.

Alis fuscis; macula communi dorsali argentea, e strigis quatuor compositis.

In *Angliae Nemoribus*.

— *Spec. Inf. II. p. 300. no. 62. Tin. Compositella.*

210. *Druella*, die *Druella*.

Fabric. S. E. p. 666. no. 64.

Alis fusco-argenteis, fascia postica aurea.
Hafniae.

— *Spec. Inf. II. p. 305. no. 89. Tin. Druella.*

211. *Aurella*, der *Goldflügel*.

Fabric. S. E. p. 666. no. 65.

Alis auratis, postice atris, fascia argentea. *Lipsiae* in *Pomonae arboribus*.

— *Spec. Inf. II. p. 305. no. 92. Tin. Aurella.*

212. *Spissicella*, das *Dickhorn*.

Fabric. Mantiss. p. 295. no. 3-4.

Alis oblongis griseis, antennarum articulis duobus inferioribus *incrassatis*.

Chilo.

Chilonii.

Fabric. Spec. Inf. p. 289. no. 4. Tin. Spissicella.

213. *Arcella*, der Braunbogen.

Fabric. Mantiss. p. 295. no. 29-30.

Alis niveis; arcu communi maculisque duabus marginalibus fuscis.

In *Germania*.

— *Spec. Inf. II. p. 296. no. 38. Tin. Arcella.*

214. *Cylindrella*, die Walzenförmige Motte.

Fabric. Mantiss. p. 295. no. 34-35.

Alis anticis linearibus fuscis, maculis tribus flavis.

Hamburgi.

— *Spec. Inf. II. p. 297. no. 45. Tin. Cylindrella.*

215. *Bipunctella*, der Zweypunkt.

Fabric. Mant. p. 296. no. 38-39.

Alis fusco-cinereis, puncto marginali albo.

Hamburgi.

— *Spec. Inf. II. p. 298. no. 51. Tin. 2-punctella.*

216. *Sulphurella*, die Schwefelmotte.

Fabric. Mant. p. 296. no. 45-46.

Fusca, capite thorace alarumque basi maculaque costali sulphureis.

— *Spec. Inf. II. p. 300. no. 61. Tin. Sulphurella.*
In *Germaniae Nemoribus*.

217. *Seppella*, der doppelte Silberstrich.

Fabric. Mantiss. p. 296. no. 52-53.

Alis auratis, strigis duabus argenteis.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 301. no. 70. Tin. Seppella.*

218. *Cramerella*, der schwarze Endpunkt.

Fabric. Mantiss. p. 296. no. 64-65.

Alis pallide argenteis postice fuscis maculis marginalibus argenteis punctoque terminali atro.
In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 305. no. 90. Tin. Cramerella.*

219. *Linetella*, der lineirte Flügel.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 291. no. 12.

Alis albidis fusco-lineatis, apice strigis duabus fuscis.

In *Agro Pedemontano*.

220. *Strigella*, die silberne Randstreife.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 293. no. 22.

Alis anticis cinereo-flavescentibus, striga marginali argentea.

In *Germania*.

221. *Marginella*, der weiße Wulstrand.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 293. no. 23.

Alis anticis fuscis, margine crassiori albo, palpis porrectis incrassatis.

222. *Gramella*, die Winkelstreife.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 294. no. 26.

Alis cinereis, strigis duabus angulatis fuscis, argenteaque marginali.

In *Anglia*.

223. *Scalacella*, das schwarze Treppchen.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 294. no. 28.

§. Alis coerulescenti cinereis, punctis vitta media maculisque rhombeis contiguis atris.

Beschäftigungen der Berlin. Gesellsch. Naturf. Fr. III. p. 36. t. I. f. 6. (D. Kühn).

224. *Stigmatella*, der *weiße Rippenfleck*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 295. no. 34.

Alis sublinearibus ferrugineis, macula costali alba.

In *Anglia*.

225. *Clematella*, die *Waldrebenmotte*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 297. no. 41.

Alis anticis niveis, lineola baseos, fascia media punctoque apicis nigris.

In *Angliae Clematide*.

226. *4-punctella*, der *Vierpunkt*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 298. no. 52.

Alis fuscis, punctis duobus albidis.

In *Germania*.

227. *Fueslella*, der *Schwarzwinkel*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 301. no. 66.

Alis auratis argenteo subfasciatis, angulo ani macula atra, punctis tribus argenteis.

In *Germaniae Nemoribus*.

228. *Sulzerella*, die *abgebrochene Streife*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 301. no. 71.

Alis cinereis, strigis tribus abbreviatis lineolisque duabus apicis argenteis fusco-marginatis.

In *Africa aequinoctiali*.

229. *Schieffermüllerella*, die *Spaltstreife*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 302. no. 75.

Alis auratis, strigis tribus nigro-argenteis, tertia externe bifida.

In *Hamburgensibus arboretis*.

230. *Bergsträsserella*, der *Flachflügel*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 302. no. 76.

Alis

Alis *planis* auratis, limbo atro punctisque argenteis numerosis.

In *Germaniae Pomariis*.

231. *Stroemella*, die *Norwegische Waldmotte*.

Fabric. Spec. Inf. p. 303. no. 80.

Alis atris, punctis quatuor argenteis, maculisque quatuor marginalibus flavis.

In *Norwagiae Nemoribus*.

— Reise durch Norwegen p. 196.

231. *Gleichenella*, die *Englische Waldmotte*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 303. no. 81.

Alis planis atris, fascia media maculisque duabus apicis oppositis argenteis.

In *Angliae Nemoribus*.

232. *Schreberella*, der *Glanzfleck*.

Fabric. Spec. Inf. p. 304. no. 86.

Alis auratis, basi fasciis duabus maculisque duabus apicis argenteis nitidissimis.

In *Anglia*.

233. *Klemannella*, die *Englische Gartenmotte*.

Fabric. Spec. Inf. p. 304. no. 87.

Alis auratis argento subfasciatis, apice maculis duabus atris, interiori oblonga tripunctata.

In *Angliae hortis*.

234. *Blancardella*, der *Siebenfleck*.

Fabric. Spec. Inf. p. 305. no. 91.

Alis auratis, lineola apicis maculisque septem marginalibus argenteis.

In *Angliae Nemoribus*.

235. *Dentella*, die *Zahnbinde*.

Fabric. S. E. p. 667. no. 2. Alucita Dentella.

Alis fuscis, apice adscendentibus; vitta dorsali communi unidentata, alba.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 306. no. 3.

In *Sueciae Caprifolio.*

Larva glabra, viridis, linea dorsali purpurea.

Pupa flava intra folliculum fusiformem utrinque apertum.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 493. no. 1.

Phalène-teigne à bande jaune du Chevre-feuille.

— *Uebersf.* II Th. I B. p. 364. no. 1. die *Motten-phaläne mit der gelben Binde auf den Geißblättern.*

Albin. Inf. t. 73. fig. e, f, g, h.

236. *Lucella*, der *Schneekopf.*

Fabric. S. E. p. 667. no. 4.

Alis flavis, immaculatis, capite thoraceque niveis.

In *Suecia.*

— Spec. Inf. II. p. 307. no. 5.

237. *Flavella*, die gelbe Rückenbinde.

Fabric. S. E. p. 667. no. 5.

Alis fuscis; vitta communi dorsali abbreviata maculaque flavis.

In *Suecia.*

— Spec. Inf. II. p. 307. no. 6.

238. *Bipunctella*, der schwarze Doppelpunkt.

Fabric. S. E. p. 668. no. 7.

Alis fuscis; vitta communi dentata, alba, thorace niveo; punctis duobus atris.

In *Lichene prunastri Saxoniae.*

Fabric.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 307. no. 8.

239. *Costella*, der *Rippenfleck*.

Fabric. S. E. p. 668. no. 10.

Nivea, alis rufo-auratis; macula *costali* baseos alba, fusco-punctata.

— Spec. Inf. II. p. 308. no. 13.

In *Anglia*.

240. *Fasciella*, die *Braunstreife*.

Fabric. S. E. p. 670. no. 18.

Alis auratis, fascia fusca, antennis apice albis.

In *Anglia*.

— Spec. Inf. II. p. 310. no. 23.

241. *Sulphurella*, der *Schwefelfleck*.

Fabric. S. E. p. 670. no. 19.

Alis anticis auratis; maculis duabus *sulphureis* oppositis, posticis flavis.

In *Anglia*.

— Spec. Inf. II. p. 310. no. 25.

242. *Oppositella*, der *Gegenfleck*.

Fabric. S. E. p. 670. no. 20.

Alis fuscis; maculis duabus *oppositis* flavis, posticis fuscis.

In *Anglia*.

— Spec. Inf. II. p. 310. no. 27.

243. *Ephippella*, die *Sattelmotte*.

Fabric. Mantiss. p. 297. no. 1. 2. *Alucita Ephippella*.

Alis pallide auratis, vitta dorsali nivea, fascia aurea.

In *Europa*.

Fabric.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 306. no. 2.

244. *Niveella*, der *Grönländer*.

Fabric. Mantiss. p. 297. no. 8. 9.

Alis niveis, maculis duabus marginalibus fasciisque media nigris, capite albo.

In *Anglia*.

— *Spec. Inf. II. p. 308. no. II.*

245. *Marginella*, der *Schneerand*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 307. no. 8. Alucita Marginella.

Alis fusco-nitidis, marginibus niveis.

In *Iuniperetis Angliae*.

246. *Striatella*, der *Gelbstrich*.

Fabric. Spec. Inf. II. p. 310. no. 24.

Alis auratis, flavo-striatis, fascia media flavo cupro marginata.

In *Angliae hortis*.

247. *Atomella*, die *Atomenmotte*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 518.

Alis ex albo fuscoque variis, strigis longitudinalibus nigro-punctatis; margine postico argenteo.

In *Pratis*.

248. *Wiedemanella*, der *blaue Silberpunkt*.

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 519.

Alis fulvis, fasciis maculisque albis, lineis punctisque coeruleo-argenteis.

In *Pratis*.

— *Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1601.*

249. *Obliquella*, die *Schregstreife*.

Mülleri

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 520.

Alis plumbeis, fasciis duabus obliquis albidis,
margine infima albo nigroque tessulato.

In *Pratis*.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1602.

250. *Ludvigella*, das braune Dreyeck. *)

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 522.

Alis griseis; basi priorum macula magna,
margine extimo triangulo minimo fusco.

In *Horto*.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1604.

251. *Hebenstreitella*, der Düstereck. **)

Mülleri Faun. Fridr. p. 58. no. 523.

Alis subfuscis, priorum maculis tribus obscu-
ris umbraticis.

In *Horto*.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1605.

252. *Filicella*, der Fadenflügel.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1600.

Alis superioribus apice in acumen erectis fu-
scis, linea dorsali communi medio divergente,
antennis pedibusque albis.

253. *Angulella*, der Silberwinkel.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1595.

Alis cinereis lanceolatis, superioribus angulis
duobus argenteis, lineolaque apicis nigra.

254. *Hauberella*, der Weißsaum.

Mülleri

*) Hierbey *Rösel* I. NV. 4. t. II. die doch mit *Linn.* *Cucullatella* no. 376. einerley ist.

**) Hierbey *Rösel* I. NV. 4. t. 2. Diese wird bald für *Linn.* *Tor-
trix Rosana* no. 293. bald für *Oporana* no. 292. ausgegeben.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1596.

Alis anticis ciliisque albis, posticis utrinque,
anticisque subtus, nigro-cinereis.

255. *Albella*, die *Schneemotte*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1597.

Alis totis albis ciliatis, oculis nigris.

Geoffr. Inf. II. p. 185. no. 8.

Tinea tota alba oculis nigris.

La Teigne blanche.

Long. $2\frac{1}{2}$ lign.

256. *Goexella*, die *gelbe Längsstreife*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1598.

Alis fulvescentibus, superioribus striga longitudinali communi flava, linea marginis inferioris alba.

257. *Lupulella*, die *Krummstreife*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 137. no. 1599.

Alis fulvescentibus; fascia marginis superioris incurvata, maculaque inferioris flavis.

258. *Auratella*, das *silberne Ringelhorn*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1606.

Alis auratis, antennis annulo argenteo.

Der Dronth. Gesellsch. Schr. IV. p. 288. no. 54.

Tin. Aurata.

259. *Ciliatella*, der *Dreysaum*.

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1607.

Alis linearibus; anticis atomis nigris, maculisque sparsis luteis, posticis ter ciliatis.

260. *Hirundinella*, der *Schwalbenschwanz*.

Geoffr. Inf. II. p. 182. no. 1.

Tinea corniculis duobus subulatis recurvis,
cinerea, alis macula fusca.

La Teigne à queue d'hirondelle.

Long. $3\frac{1}{2}$ lign. *Larg.* 2 lign.

261. *Radiella*, das *Strahlenband*.

Geoffr. Inf. II. p. 182. no. 2.

Tinea corniculis duobus subulatis recurvis,
alis flavescentibus nitidis, striarum albidarum or-
dine duplici transverso.

La Teigne à bandes rayonnées.

Long. 5 lign.

262. *Histrionella*, der *gelbe Harlekin*.

Geoffr. Inf. II. p. 184. no. 5.

Tinea alis flavis, fasciis maculisque nigris.

L'Arlequinette jaune.

Long. $4\frac{1}{2}$ lign.

263. *Nebulella*, die *Nebelmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 185. no. 7.

Atro-plumbea, alis superioribus fusco-nebu-
lofis.

La Teigne plombée nébuleuse.

Long. 2 lign.

264. *Bordella*, die *Punktborte*.

Geoffr. Inf. II. p. 185. no. 9.

Cinerea, alarum margine inferiore punctis
nigris.

La Teigne à bordure depoints.

Long. 3½ lign.

265. *Cruciella, das Ritterkreuz.*

Geoffr. Inf. II. p. 187. no. 12.

Fusca, cruce dorsi decussata alba.

La Teigne à croix de Chevalier.

Long. 2½ lign.

266. *Triangulella, das dreysfache Dreyeck.*

Geoffr. Inf. II. p. 188. no. 15.

Nigra, alis pone albidis, macula triplici triangulari nigra.

La Teigne bedaude aux trois triangles.

Réaum. Inf. II. t. 40. f. 5.

267. *Quadrella, die Quadratmotte.*

Geoffr. Inf. II. p. 189. no. 16.

Alis nigris, superioribus macula quadrata alba ex quatuor lineolis albis transversis composita.

La Teigne à quarrure.

Long. 2½ lign.

268. *Quadrillella, der Vierfleck.*

Geoffr. Inf. II. p. 189. no. 17.

Nigra, antice albidis, maculis quatuor nigris; pone nigris, maculis duabus albis.

La Teigne à quadrille.

Long. 2⅔ lign.

269. *Duplicella, die Zweylinie.*

Geoffr. Inf. II. p. 189. no. 18.

Alis atris, punctorum alborum linea duplici transversa.

164 *Lepidoptera.* 233. *Phalaena Tinea.*

La Teigne noire à deux rangs de points blancs.

Long. $1\frac{1}{4}$ lign.

270. *Fasciella*, das Vierband.

Geoffr. Inf. II. p. 190. no. 20.

Alis dilute cinereis, fasciis tribus fuscis transversis undulatis.

La Teigne à quatre bandes brunes ondulées.

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

271. *Viridella*, das Grünband.

Geoffr. Inf. II. p. 191. no. 23.

Alis corpori circumvolutis albido-roseis, fasciis tribus obscure virescentibus.

Le Manteau à bandes verdâtres.

Long. $6\frac{1}{2}$ lign.

272. *Rosella*, der Rosenrand.

Geoffr. Inf. II. p. 192. no. 25.

Alis corpori circumvolutis albescentibus, margine roseo.

Le Manteau couleur de Rose.

Long. 7 lign.

273. *Cinerella*, die Aschmotte.

Geoffr. Inf. II. p. 192. no. 26.

Fusco-cinerea, alarum macula rhomboïdaea albida oblonga.

Le lozange cendré.

Long. 3 lign.

274. *Fissella*, die gespaltene Flügelader.

Geoffr.

Geoffr. Inf. II. p. 192. no. 27.

Alis cinereis, superioribus nitentibus, nervis multifidis fuscis.

La Teigne à nervures.

Long. 5 lign.

275. *Mediella*, der *Zwischenfleck*.

Geoffr. Inf. II. p. 194. no. 30.

Alis flavescentibus, lineis duabus et macula intermedia fuscis in extremo superiorum.

L'Entre-ligne.

Long. 5 lign.

276. *Fuscorubella*, der *braune Mönch*.

Geoffr. Inf. II. p. 194. no. 31.

Fusco-rubra, alarum superiorum margine exteriori maculis duabus flavis.

La Teigne à deux taches jaunes en bordure.

Long. 3 $\frac{1}{2}$ lign.

277. *Marmorella*, die *Märmormotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 195. no. 34.

Nigro-fusca, rivulis flavescentibus marmorata.

La Teigne à marbrure.

Long. 5 lign.

278. *Obliquella*, der *Sonderling*.

Geoffr. Inf. II. p. 196. no. 36.

Cinerea, alarum fascia triplici obliqua undulata fusca.

La Teigne grise à trois sautoirs bruns.

166 *Lepidoptera. 233. Phalaena Tinea.*

Long. 3½ lign.

279. *Thoracella, der gestreifte Brustschild.*

Geoffr. Inf. II. p. 196. no. 37.

Capite thoraceque flavo lineis longitudinalibus fuscis, alis albo-flavescentibus, fasciis transversis fuscis.

La Teigne à corcelet rayé.

Long. 4 lign.

280. *Interruptella, das Bruchband.*

Geoffr. Inf. II. p. 197. no. 38.

Albo-flavescens, fasciis duabus obliquis ferrugineis, posteriore interrupta.

La Teigne à bande interrompue.

Long. 2½ lign.

281. *Kochiella, das Randdreieck.*

Geoffr. Inf. II. p. 197. no. 39.

Alba, margine alarum exteriori maculis tribus fuscis, triangulum referentibus.

La Teigne à triangle marginal.

Long. 3½ lign.

282. *Esperella, das Fünfband.*

Geoffr. Inf. II. p. 197. no. 40.

Alba, alis superioribus lineis quinque transversis fuscis.

La Teigne blanche à cinq bandes brunes.

Long. 1⅔ lign.

283. *Laichartingella, der eingeschnittene Rand.*

Geoffr. Inf. II. p. 198. no. 41.

Fusca,

Fusca, linea duplici transversa flava, margine alarum undique flavo-intersecto.

La Teigne à bordure herminée.

Long. 2 lign.

284. *Schränkella*, der *Weißring*.

Geoffr. Inf. II. p. 198. no. 42.

Alis superioribus nigris, fascia longitudinali, maculisque duabus aureis, antennis medio-albis.

La Teigne à bande dorée, & anneau blanc aux antennes.

Long. $2\frac{3}{4}$ lign.

285. *Herbstella*, die *Safranmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 200. no. 46.

Crocea, lineis transversis fusco-argenteis interruptis, alarum medio macula alba punctisque plumbeis.

La Teigne crayonnée.

Long. $3\frac{1}{2}$ lign.

286. *Borowskiella*, die *Schimmelmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 201. no. 47.

Albida, lineis longitudinalibus reticulatis fuscis, involucro villoso-albescente.

La Teigne moïse.

Long. 4 lign.

287. *Bernoulliella*, die *Stielmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 201. no. 48.

Alis cinereis, lineis albis, fasciaque longitudinali fusca, involucro fusco pediformi.

La Teigne à fourreau en crosse.

Long. 4 lign.

Réaum. Inf. Tom. III. t. 16.

288. *Kühnella*, die *Plattenmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 202. no. 49.

Nigro-cinerea, involucro fusco recurvo, lamina duplici foliosa tecto.

La Teigne à fourreau à deux lames.

Long. 3 lign.

289. *Lapidella*, die *Steinmoosmotte*.

Geoffr. Inf. II. p. 204. no. 53.

La Teigne des pierres à fourreau rond en capuchon.

(Noch nie zur Verwandlung gebracht.)

Réaum. Inf. III. t. 15. f. 1. 2. 3.

— No. 54. *La Teigne des pierres à fourreau triangulaire à pans.*

Réaum. Inf. III. t. 15. f. 7. 8.

290. *Anomalella*, der *Hautfuß*.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 495. no. 7.

Phalène à antennes filiformes, à trompe, à ailes étroites élevées grises, d'une chenille mineuse du Rosier.

Phalène-teigne mineuse grise du Rosier.

Degeer Tom. I. t. 30. f. 20. t. 31. f. 13. 14. 16.

La Chenille une mineuse jaune à dix-huit pattes membraneuses & point de pattes écailleuses, qui mine les feuilles du Rosier en galeries.

— *Uebersf.* I. 3 Quart. p. 41. t. 30. f. 20. t. 31. f. 13. 14. 16.

— II Th. I B. p. 366. no. 7. die graus Rosenblattminirmotte.

Naturforscher 15tes St. p. 21. t. 2. f. 1-12. die wahre, aber unendlich kleine Phaläne der Degeerischen Raupe mit 18 häutigen Wulstfüßen.

291. *Frangutella*, die Faulbaumotte.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 496. no. 8.

Phalène-teigne blanche, tachetée de brun de l'Aune noir.

— Tom. I. t. 32. f. 1. 4. 8. 9. 10. 11.

— *Uebersf.* I. 3 Quart. p. 49. t. 32. f. 1. 4. 8. 9. 10. 11.

— II Th. I B. p. 367. no. 8. die weiße braungefleckte Faulbeermottenphaläne.

292. *Chaerophyllella*, die Kälberkropfmotte.

Degeer Inf. Tom. II. Part. I. p. 496. no. 9.

Phalène-teigne à ailes happées, du Cerfeuil sauvage.

— Tom. I. t. 29. f. 9-18.

— *Uebersf.* I. 3 Quart. p. 46. t. 29. f. 9-18.

— II Th. I B. p. 367. no. 9. die wilde Kerbelmottenphaläne mit gebüschelten Flügeln.

293. *Entella*, die *Koromandelsche Entella*.

Cramer Pap. exot. III. p. 27. t. 208. Fig. D.

Alis flavis; anticis maculis purpurascens rubro-marginatis, posticis flavo-venosis.

294. *Nobilitella*, der *Kurakaner*.

Cramer Pap. exot. III. p. 128. t. 264. Fig. G.

Alis anticis fusco-rubris, maculis albissimis nigro-marginatis, posticis incarnatis fusco-marginatis.

295. *Molinella*, der *Scheckflügel*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 113. t. 348. Fig. G.

Alis anticis pulchre variegatis, posticis luteis.

296. *Florella*, die *Surinamische Florella*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 114. t. 348. Fig. L.

Fusca, flavo-maculata.

297. *Argentella*, die *Surinamische Silbermotte*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 135. t. 359. Fig. I.

Tota argentea, marginibus nigricantibus.

298. *Petronella*, die *Surinamische Petronella*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. K.

Testacea, atro-striata.

299. *Punctella*, der *Surinamische Goldpunkt*.

Cramer Pap. exot. IV. p. 164. t. 372. Fig. L.

Nigra, punctis aurantiacis atomisque flavis.

300. *Nigrella*, der *ostindianische Mohr*.

Linn. S. N. ed. 12. Tom. III. App. p. 225.

Alis atris, strigis albis, anteriore simplici, posteriore circumflexa.

Müllers Suppl. B. p. 314. G. no. 453. a. der *Weißstriem*.

VII. *Federmotten. Alucitae.*

(*Fächerfalter; Federvögel; Geistgen.* Les Papilions à ailes en plumes. Réaum. Les Pterophores. Geoffr. Phaléne - Tipule Degeer).

453. *Monodactyla*, die *Einfeder*.

Müller l. c. p. 756. no. 453. *Einfeder*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 848. Aluc. *Monodactyla*.

Réaum. Inf. I. t. 20. f. 12-16.

Fabric. S. E. p. 671. no. 1. *Pterophorus Monodactylus*. Nom. Linn.

— Spec. Inf. II. p. 310. no. 1.

Mülleri Faun. Fridr. p. 59. no. 524. Aluc. *Monod.* Nom. Linn.

— Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1608.

454. *Didactyla*, die *Zweyfeder*.

Müller l. c. p. 757. no. 454. *Zweyfeder*.

Füesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 849. Aluc. *Didactyla*.

Gleditsch Forstwiss. II. p. 939. no. 4. Aluc. *Didactyla*.

Die braune Feder- oder Fingermotte mit ästigen zwey- und dreytheiligen Flügeln.

Wien. Schmett. p. 145. no. 2. *Märzenwurzgeistchenraupe* (*Gei rivalis*); *Märzenwurzgeistchen*. Al. *Didact.* L.

Schäffers Inf. III. p. 146. c. fig. der *Federfalter*.

— Icon. t. 159. f. 5. *Pterophorus secundus*.

Bekm. Ep. S. L. p. 168. no. 454.

Raj. Hist. Inf. p. 225. no. 101.

Phalaena minima, alis amplis, nervis rigidis, membrana connectente, facile disrupta a se invicem disiunctis.

Ex *Eruca parva incarnata*, Caprifolii folia depascente.

Scop. Ent. carn. p. 256. no. 672.

Alae fuscae; anticae semibifidae, segmento inferiore falcato, omnibus rachi albida.

In *Pratis nostris*.

Long. lin. 5.

Fabric. S. E. p. 671. no. 2. *Pterophorus didactylus*.

Alis fissis, fuscis, strigis albis; anticis bifidis, posticis tripartitis.

In *Convolvulo*; *Geo rivali*.

— *Spec. Inf.* II. p. 310. no. 2.

Larva 16-poda, viridis, fasciculato-pilosa.

Pupa elongata, lineis duabus dorsalibus tuberculorum quadri-spinosorum.

Mülleri Faun. Fridr. p. 59. no. 525. *Aluc. didactyla*. Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 138. no. 1609.

(An *Schaeff.* Icon. t. 93. f. 7?)

Degeer Inf. Tom. II. p. 260. no. 1. t. 4. f. 1-9.

Phalène-Tipule à aile brunes rayées de blanc, dont les supérieures sont divisées en deux, & les inférieures en trois parties barbues.

Phalène-Tipule brune rayée de blanc.

— *Uebers.* II Th. I B. p. 186. no. 1. t. 4. f. 1-9.

Die braune, weißgestreifte Erdschwakenphaläne.

455. *Tridactyla*, die Dreyfeder.

Müller l. c. p. 757. no. 455. t. 22. f. 18. *Dreyfeder*.

Fießl.

Friesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 850. Aluc. Tridactyla.

Scop. Ent. carn. p. 257. no. 675. Ph. Tridactyla.

Nivea tota, alis anticis ultra medium bifidis;
posticis trifidis.

In Pratis.

Long. lin. 6.

Poda Mus. graec. t. 2. f. 14.

Fabric. S. E. p. 671. Pterophorus 3. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 311. no. 3. In Europae hortis.*

Beschäftigungen Naturf. Fr. zu Berl. III. t. 1. f. 8.

(D. Kühn).

Mülleri Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1610. An Al. tri-
dactyla?

Alis patentibus fissis, griseis, macula fusca, li-
neaque apicis transversa alba; posticis tripartitis.

456. *Tesseradactyla*, die *Wolkenfeder*.

Müller l. c. p. 757. no. 456. Wolkenfeder.

Pontopp. N. G. v. Dännem. p. 222. t. 17.

Fabric. S. E. p. 671. Pterophorus 4. Nom. Linn.

— *Spec. Inf. II. p. 311. no. 4.*

Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 527. Aluc. Tesserada-
ctyla. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1611.*

457. *Tetradaactyla*, die *Vierfeder*.

Müller l. c. p. 757. no. 457. t. 22. f. 19. Vierfeder.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 20. die Vier-
feder.

Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 528. Aluc. Tetradacty-
la. Nom. Linn.

— *Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1612.*

458. *Pterodactyla*, die *Flügelfeder*.

Müller

Müller l. c. p. 757. no. 458. *Flügfeder.*

Pontopp. Nat. Gesch. von Dännem. p. 222. t. 17.

Wien. Schmett. p. 146. no. 6. Tab. I. a. f. 8. *Wind-
linggeistchenraupe* (*Convolvuli arvensis*); *Wind-
linggeistchen.* Tab. I. b. f. 8. A. *Pterodactyla*
L.

Scop. Ent. carn. p. 257. no. 674.

Alae anticae bifidae, divisura lineari, puncto
nigro medio notatae.

In pratis sterilioribus.

Long. lin. 4.

Fabric. S. E. p. 671. *Pterophorus* 5. Nom. *Linn.*

— *Spec. Inf.* II. p. 311. no. 5.

Larva subpilosa coerulea, linea dorsali pur-
purea.

Geoffr. Inf. II. p. 92. no. 2.

Pterophorus fuscus, alis superioribus apice bi-
partitis, inferioribus tripartitis.

Le *Pterophore* brun.

Long. 10 lign.

Adt. Upsal. 1736. p. 26. no. 87. *Papilio* alis ramo-
sis.

Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 526. Al. *Pterodactyla.*
Nom. *Linn.*

— *Zool. Dan. Pr.* p. 138. no. 1613.

459. *Pentadactyla, Fünffeder.*

Müller l. c. p. 758. no. 459. *Fünffeder.*

Früesl. Schweiz. Inf. p. 43. no. 851. Aluc. *Pentada-
ctyla.*

Röfels Insektenbel. I. NV. 4te Kl. p. 12. t. 5. das
kleine, dicke, blafsgrüne *Räuplein* mit braunen
Punkten und hellen Streifen.

Maders (Kleem.) Raupenkal, p. 18. no. 31. *Fünf-
feder.*

Wien.

*Wien. Schmett. p. 146. no. 9. Schlehengeistchen-
raupe (Pruni Spinolae); Schlehengeistchen. Aluc.
Pentadactyla L.*

*Leske Anfangsgr. der N. G. I. p. 464. no. 28. weiße
Federmotte.*

*Behm. Epit. S. L. p. 168. no. 459. Aluc. Pentada-
ctyla.*

*Gleditsch Forstwiss. II. p. 939. no. 5. Aluc. Penta-
dactyla.*

*Die weiße Federmotte mit fünfstheiligen Flie-
gelu.*

Fabric. S. E. p. 672. Pterophorus 6.

Alis niveis, anticis bifidis, posticis tripartitis.

— *Spec. Inf. II. p. 311. no. 6.*

*Larva 16-poda, pilosa, viridis nigro-puncta-
ta lineaque dorsali alba.*

Pupa pilosa, viridis, nigro-punctata.

*Mülleri Faun. Fr. p. 59. no. 529. Aluc. Pentada-
ctyla. Nom. Linn.*

— *Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1614.*

Geoffr. Inf. II. p. 91. no. 1. t. XI. f. 6.

*Pterophorus albus, alis superioribus bipartitis,
inferioribus tripartitis.*

Le Pterophore blanc.

Long. 1 pouce.

460. *Hexadactyla, die Sechsfeder.*

Müller l. c. p. 758. no. 460. Sechsfeder.

*Füesl. schweiz. Inf. p. 43. no. 852. Aluc. Hexada-
ctyla.*

*Frisch Inf. III. p. 20. no. 10. 2te Pl. t. 7. f. 1-5. von
dem kleinen Caprifoliumblütränplein.*

*Blumenbachs Handb. der N. G. I. p. 372. no. 22. Al-
Hexadactyla.*

Wien. Schmett. p. 146. no. 10. *Heckenkirschengest-
chenraupe* (Lonicerae Xylostei); *Heckenkirschen-
geistchen*. Al. *Hexadactyla* L.

Bkm. Ep. S. L. p. 168. no. 460. Al. *Hexadactyla*.

Scop. Ent. carn. p. 258. no. 676.

Alae singulae sexpartitae fuscae albis transver-
sis lineolis fasciatae.

Circa *Labacum*.

Long. lin. $3\frac{1}{3}$.

Fabric. S. E. p. 672. *Pterophorus* 7.

Alis fissis, cinereis, singulis sexpartitis.

— Spec. Inf. II. p. 312. no. 7.

Geoffr. Inf. II. p. 92. no. 3.

Pterophorus cinereus, fusco-maculatus, alis
superioribus octopartitis, inferioribus quadripar-
titis.

Le *Pterophore en Evantail*.

Long. 6 lign.

Neue Arten von Federmotten.

1. *Diptera*, die *Einfeder*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 19.

Alis lanceolatis albidis, fusco-maculatis,

2. *Paradoxa*, *Meyersvögelein*.

Sulzers Gesch. der Inf. p. 163. t. 23. f. 21. vergröß.
f. 22.

Alis pilosis binis; elinguis, barba divisa ma-
gna.

Fortasse *foemina* —

3. *Ochrodactyla*, blaßröthlichgelbes *Geistchen*.

Wien. Schmett. p. 145. no. 1. Unbek. R.

4. *Tri-*

4. *Trichodactyla*, Braunes weißgestrichtes Geistchen.

Wien. Schmett. p. 145. no. 3. Unbek. R.

5. *Calodactyla*, Dunkelbraun und Oraniengelb gemischtes Geistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 4. Unbek. R.

An Degeer Inf. Tom. II Part. 1. p. 267. no. 2. t. 3. f. II. 12. *Phalène-Tipale brune?*

— Uebersf. II Th. I B. p. 190. no. 2. t. 3. f. II. 12. die braune Erdschnakenphaläne.

6. *Rhododactyla*, Heckrosengeistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 5. Heckrosengeistchen-raupe (*Rosae caninae*).

7. *Leucodactyla*, Lungenkrautgeistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 7. Lungenkrautgeistchen-raupe (*Pulmonariae officinalis*).

8. *Megadactyla*, Weißlichtes bräunlichgeflecktes Geistchen.

Wien. Schmett. p. 146. no. 8. Unbek. R.

9. *Chrysodactyla*, Braunes Geistchen mit Goldglänzenden Querstrichen.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. Unbek. R.

10. *Micodactyla*, Flachsblüthfarben, bleichroth und braungemischtes Geistchen.

Wien. Schmett. Nachtr. p. 320. Unbek. R.

11. *Gonodactyla*, Bräunlichweißes Geistchen mit einem düstern Dreyeckfleckchen.

III. Th. IV. Band.

M

Wien.

Wien. Schmett. p. 320. Unbek. R.

12. *Galactodactyla*, *Milchrahmfarbenes Geistchen mit einem düstern Punkte.*

Wien. Schmett. p. 320. Unbek. R.

13. *Bipunctidactyla*, *die Zweypunktfeder.*

Scop. Ent. carn. p. 257. no. 673.

Alae anticae cinereae, punctis tribus, nigris, lineaque fusca longitudinali in limbo.

In Sylvestribus.

Long. lin. 4.

14. *Heterodactyla*, *der Fremdling.*

Mülleri Faun. Fridr. p. 59. no. 530.

Alis patentibus fissis, nigris, maculis albis, anticis bifidis, posticis tripartitis.

In horto.

— *Zool. Dan. Pr. p. 138. no. 1615.*

Ende der Lepidopterorum.



Goeze, Johann August Ephraim,

Entomologische Beyträge Zu Des Ritter Linné Zwölften Ausgabe Des
Natursystems

Bd.: Dritten Theiles Vierter Band

1783

Bamberg, Staatsbibliothek -- Zool.o.79(5#2
urn:nbn:de:bvb:12-bsb11784741-9
VD18 90544129